UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Impatto delle variabili neuroradiologiche in corso di trombectomia meccanica nei pazienti con ictus ischemico acuto

Relatore**:** Chiar.mo
Prof. Gabriele Polonara

Tesi di Laurea di:
Giacomo Curti

Correlatore**:** Chiar.ma
Prof.ssa Giovanna Viticchi

A.A 2024/2025

Sommario

1. Introduzione 3
1.1 Definizione di ictus 3
1.2 Epidemiologia 3
2. Fisiopatologia dell'ictus 6
2.1 Principali fattori di rischio 6
2.2 Eziologia dell'ictus ischemico 7
2.3 Processi fisiopatologici 8
2.3.1 Eccitossicità cellulare 10
2.3.2 Disfunzione mitocondriale 10
2.3.3 Morte cellulare programmata e non programmata 11
2.3.4 Neuroinfiammazione e alterazione della barriera emato-encefalica 12
3. Clinica dell'ictus ischemico 14
4. Diagnosi di ictus 18
4.1 TC nell'ictus 18
4.1.1 TC senza mezzo di contrasto in acuto 19
4.1.2 TC senza mezzo di contrasto in fase subacuta e cronica 22
4.1.3 Angio-TC 24
4.1.4 TC Perfusionale 27
4.2. Risonanza Magnetica nell'ictus ischemico 29
5. Terapia dell'ictus ischemico 33
5.1 Terapia fibrinolitica 33
5.2 Trombectomia meccanica 35
5.2.1 Tipologie di cateteri utilizzati nella trombectomia meccanica 37
5.2.2 Complicanze della trombectomia meccanica 40
5.2.3 Ricanalizzazioni futili e predittori di esito positivo 42
5.2.4 Terapia di supporto 47
6. Obiettivo dello studio 48
7. Metodologia dello studio 49
8. Risultati 52
8.1 Analisi di permutation importance 52
8.2 Analisi di SHAP del Gruppo 0 53

8.3 Analisi di SHAP del Gruppo 1 55
8.4 Analisi di SHAP del Gruppo 2 57
8.5 Mismatch ratio 59
9. Discussione 60
10. Conclusioni 65
11.Bibliografia 66

1. Introduzione

1.1 Definizione di ictus

L'ictus è una sindrome clinica caratterizzata dalla improvvisa interruzione della vascolarizzazione ad una porzione di parenchima cerebrale. Tale interruzione comporta una riduzione dell'apporto di ossigeno e sostanze nutritive con la successiva morte delle cellule che lo compongono e, conseguentemente, la perdita o l'alterazione delle funzionalità neurologiche a cui l'area è deputata.

Sotto la definizione di ictus rientrano diverse condizioni, quali:

- Ictus ischemico: rappresenta circa l'80% del totale, causato dall'occlusione trombo-embolica di una arteria, dovuta a condizioni sottostanti come la presenza di placche aterosclerotiche oppure di aritmie, in primis la fibrillazione atriale.
- Ictus emorragico: dovuto alla lacerazione di un'arteria all'interno del parenchima cerebrale (circa il 15-20%) oppure nello spazio sub-aracnoideo (circa il 3-4%). (Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/new/it/scheda-malattia/ictus/)

1.2 Epidemiologia

L'ictus rappresenta la seconda causa di mortalità (9-10% di tutti i decessi), seconda solo alle cardiopatie ischemiche acute, e la prima causa di invalidità permanente nei paesi industrializzati tra cui l'Italia, rendendosi responsabile ogni anno di 90.000 ricoveri, di cui il 20% di queste recidive. (Ictus: i numeri in Italia – SIIA, https://siia.it/per-il-pubblico/lictus/ictus-i-numeri-in-italia/)

L'età media di insorgenza della patologia è di 74,6 ± 1,1 anni nella popolazione generale, variando leggermente tra i due sessi con valori di 72,3 anni nell'uomo e 76,6 anni nella donna.

L’incidenza allo stesso modo si dimostra essere variabile in base al sesso, attestandosi tra i 175 e i 360 casi per 100.000 abitanti nell’uomo e i tra i 130 e i 273 casi per 100.000 abitanti nella donna.

La mortalità a 30 giorni oscilla tra il 18,1 e il 33%, aumentando al 37,9-40,2% ad un anno. (Sacco et al., 2011)

Un aspetto fondamentale di questa condizione, oltre alla mortalità, è l’invalidità che residua dopo l’evento acuto, dove solo il 25% dei pazienti guarisce completamente; il restante 75% sopravvive con qualche forma di disabilità e la metà di questi risulta non più autosufficiente.

Questo dimostra come l’ictus sia una patologia di fondamentale importanza clinica ma anche sociale, impattando non solo sul paziente ma anche sulla famiglia e sulla società. (Ictus: i numeri in Italia – SIIA, https://siia.it/per-il-pubblico/lictus/ictus-i-numeri-in-italia/)

Il costo dell’ictus per il Sistema Sanitario Nazionale è stato valutato in 3,7 miliardi di euro, il 4% della spesa annuale totale, di cui un terzo per il trattamento della fase acuta mentre i restanti due terzi per la gestione della disabilità.

Un aspetto positivo riguarda l’evoluzione dei dati sulla mortalità; infatti, secondo il Global Burden of Disease, si è osservata una diminuzione di oltre il 30% negli ultimi 30 anni. (*Riabilitazione post ictus, Regioni italiane in ritardo*, https://neurologiaitaliana.it/2017/riabilitazione-post-ictus-regioni-italiane-ritardo/)

Il merito è da attribuire a diversi fattori quali le campagne di sensibilizzazione sulla patologia e sui suoi principali fattori di rischio, al miglioramento dell’efficacia delle misure preventive, terapeutiche, assistenziali e riabilitative. (*L’ictus colpisce 12 milioni di persone nel mondo. Ma con la prevenzione si può evitare fino al 90% dei casi. Il punto sull’ictus con gli esperti Iss - ISS*. https://www.iss.it/-/giornata-mondiale-dell-ictus-2024-colpisce-12-milioni-di-persone-nel-mondo-ma-con-la-prevenzione-si-puo-evitare-fino-al-90-dei-casi-il-punto-sull-ictus-con-gli-esperti-iss)



Figura 1: Andamento dei ricoveri per ictus dal 2015 al 2023. (https://pne.agenas.it/ospedaliera/indicatori/125?tab=italia&mode=0)

2. Fisiopatologia dell'ictus

2.1 Principali fattori di rischio

I fattori di rischio correlati con l'insorgenza dell'ictus sono molteplici e sono classificabili in modificabili e non modificabili.

Tra i modificabili, così definiti poiché possibile correggerli tramite modificazioni dello stile di vita o terapie farmacologiche, rientrano:

1. Ipertensione: svariati studi hanno dimostrato una correlazione forte tra valori pressori e insorgenza di ictus, sia emorragico che ischemico; pertanto, la valutazione della pressione arteriosa ed eventuale terapia con ripristino dei valori ottimali (<130/80) risulta essenziale nella prevenzione.
2. Diabete e prediabete: negli adulti con diabete si ha un aumento del rischio di ictus per ogni aumento percentuale di emoglobina glicata; di conseguenza è di vitale importanza trattare tramite accorgimenti dietetici e/o farmacologici condizioni di iperglicemia.
3. Obesità: può essere valutata tramite BMI, dove per ogni 5 kg/m^2, il rischio di ictus aumenta del 10%, oppure tramite altri indicatori come il WC (circonferenza della vita) dove ogni 10 cm di aumento al di sopra degli 80 cm per la donna e dei 94 cm per l'uomo si ha un aumento del rischio del 10%. Inoltre, rappresenta una condizione molto spesso associata a dislipidemie, ulteriore fattore di rischio per ictus e malattie cardiovascolari in generale.
4. Fibrillazione atriale: in Italia colpisce circa 120.000 persone ogni anno e si stima che sia responsabile del 15% degli ictus nel mondo. La variazione della dinamica atriale comporta una alterazione del normale flusso sanguigno, rendendo più probabile la formazione di coaguli ematici all'interno dell'auricola dell'atrio sinistro. La loro frammentazione, successivamente, può portare alla formazione di emboli diretti verso la circolazione cerebrale.
5. Fumo di sigaretta: è responsabile di circa il 18% degli ictus nel mondo. La nicotina contenuta in esso causa un aumento dell'aggregazione piastrinica, porta a vasocostrizione e favorisce la formazione di placche aterosclerotiche a causa

dell'ossidazione delle LDL, aumentando il rischio di ictus in caso di utilizzo cronico.

Tra i non modificabili invece si annoverano in primis l'età, dove a partire dai 55 anni l'incidenza aumenta, raddoppiando poi per ogni decade. Un altro fattore importante è il sesso: dai dati emerge che gli uomini tendono ad avere un rischio maggiore di sviluppare ictus, ma le donne, nonostante la minore incidenza, manifestano delle conseguenze peggiori in termini prognostici. (Chaturvedi et al., 2024)

2.2 Eziologia dell'ictus ischemico

La classificazione TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) divide l'ictus in 5 tipologie:

1. Su base aterosclerotica dei grandi vasi: si caratterizza per la presenza di una stenosi significativa (>50%) o un'occlusione a carico di arterie cerebrali principali o dei loro rami corticali, documentata tramite imaging cerebrale e vascolare. I segni clinici più comuni includono deficit corticali focali (afasia, neglect, emiparesi limitata), disfunzioni del tronco encefalico o del cervelletto.
2. Origine cardioembolica: è causato da occlusioni arteriose dovute a emboli di origine cardiaca. I reperti clinici e di neuroimaging sono simili a quelli osservati nell'aterosclerosi dei grossi vasi. Tuttavia, la presenza di pregressi TIA o ictus in più territori vascolari, o di embolie sistemiche, rafforza l'ipotesi di un'origine cardiogena.
3. Ictus lacunari: sono strettamente correlati alla sottostante presenza di ipertensione arteriosa. All'imaging cerebrale i reperti sono tipicamente normali oppure mostrano una lesione del tronco encefalico o della zona sottocorticale con diametro inferiore a 1,5 cm.
4. Di altra origine conosciuta: dovuto a cause non comuni, come vasculopatie, stati di ipercoagulabilità o disordini ematologici. La diagnosi si basa su reperti clinici e di imaging compatibili con ictus ischemico acuto, indipendentemente da sede o dimensione della lesione, e sull'esclusione di cause cardioemboliche e aterosclerotiche.
5. Di origine sconosciuta: questa categoria racchiude pazienti di cui non si riesce ad identificare con certezza una causa oppure sono compresenti due o più potenziali

cause, senza che sia possibile stabilire con sicurezza quella predominante. (*Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment,* https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/01.STR.24.1.35)

A partire dalla classificazione TOAST del 1993 sono state poi elaborate successive classificazioni come la CCS (Causative Classification System), la A-S-C-O (Atherosclerosis, Small-vessel disease, Cardiac source, Other causes), la CISS (Chinese Ischemic Stroke Subclassification) o la SPARKLE (Subtypes of Ischaemic Stroke Classification System). (Chen et al., 2012 – Zhang et al., 2019)

Queste classificazioni rappresentano strumenti fondamentali nella ricerca e nella pratica clinica per identificare la causa scatenante l'evento ischemico, guidare le decisioni terapeutiche, migliorare la prognosi dei pazienti e prevenire eventuali recidive trattando la patologia alla base.

2.3 Processi fisiopatologici

Durante l'ictus ischemico, diverse popolazioni cellulari del sistema nervoso centrale subiscono specifiche alterazioni morfologiche, che variano in base alla localizzazione del danno.

Nel core ischemico, i neuroni vanno incontro a degenerazione irreversibile, con scomparsa del corpo cellulare e degli assoni, rigonfiamento del citoplasma e perdita del nucleolo, con alterazioni simili anche nelle cellule gliali.
Nella penombra ischemica, dove il tessuto è ancora potenzialmente recuperabile, i neuroni ischemici presentano alterazioni strutturali più moderate, come la degenerazione dei ribosomi del reticolo endoplasmatico e dei corpi di Nissl, indicativi di una sofferenza cellulare parziale.
L'interruzione del flusso ematico cerebrale, priva il tessuto cerebrale di ossigeno e glucosio, con conseguente deficit energetico, alterazione della sintesi di ATP, perdita dell'omeostasi ionica e dell'equilibrio acido-base. Questi squilibri conducono a

profonde modificazioni neuropatologiche, alla base dei deficit neurologici tipici dell'ictus.

Negli ultimi anni, significativi progressi hanno permesso di chiarire i principali meccanismi patogenetici dell'ictus ischemico, che comprendono:

1. Eccitotossicità cellulare.
2. Disfunzioni mitocondriali.
3. Morte cellulare programmata e non programmata.
4. Neuroinfiammazione e alterazione della barriera emato-encefalica. (Cin et al., 2022)



Figura 2: Principali processi fisiopatologici coinvolti nell'ictus. (Qin et al., 2022)

2.3.1 Eccitossicità cellulare

La carenza di ATP altera l'equilibrio ionico intracellulare (Na^+, K^+ e Ca^{2+}), provocando depolarizzazione neuronale e conseguente rilascio massivo di glutammato. L'eccesso di glutammato attiva in modo anomalo i recettori N-metil-D-aspartato (NMDAR), inducendo un meccanismo noto come eccitotossicità, che porta alla morte cellulare e a un danno esteso al sistema nervoso centrale. (Willard & Koochekpour, 2013)

2.3.2 Disfunzione mitocondriale

La riduzione dell'apporto di ossigeno e glucosio da parte del circolo ematico comporta danno mitocondriale e attivazione di uno stato di stress ossidativo con produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) che inducono danno a diverse strutture cellulari

quali DNA nucleare, membrana plasmatica e gli stessi mitocondri. (Murphy et al., 1999)

2.3.3 Morte cellulare programmata e non programmata

I danni neuronali indotti da eccitotossicità, stress ossidativo e disfunzione mitocondriale nell'ictus ischemico attivano numerose cascate di segnalazione intracellulare, che conducono alla morte cellulare programmata o non programmata: la prima comprende autofagia e apoptosi, processi fisiologici regolati che, in condizioni normali, contribuiscono all'omeostasi cellulare; la seconda, come la necrosi, è invece il risultato di stimoli esterni, come la deprivazione totale di ossigeno e glucosio nel core ischemico, ed è generalmente irreversibile.
Per quanto riguarda l'autofagia studi recenti dimostrano che viene attivata in diverse popolazioni cellulari del sistema nervoso centrale durante l'ictus ischemico, inclusi neuroni, cellule gliali e cellule endoteliali. Questo processo, fondamentale per il mantenimento dell'omeostasi cellulare, può avere effetti sia protettivi che dannosi in risposta al danno ischemico in quanto si è dimostrata avere complesse interazioni con numerose vie di segnalazione intracellulari, tra cui mTOR, AMPK, MAPK, NF-κB, p53, HIF-1 e Bcl-2.

L'apoptosi, in particolar modo quella neuronale, riveste un ruolo chiave, soprattutto nella penombra ischemica, dove le cellule sono danneggiate ma ancora potenzialmente recuperabili. Può essere attivata mediante due principali vie: la via estrinseca, mediata da diversi ligandi quali FasL, TNFalfa e TRAIL, e i loro rispettivi recettori Fas, TNFalfa receptor 1 e TRAIL-R; mentre quella intrinseca viene innescata dal rilascio di Citocromo C da parte del mitocondrio danneggiato a causa dell'aumento di Ca^{2+} dovuto alla deplezione dell'ATP. La via intrinseca inoltre è anche attivata dalla proteina p53, che viene upregolata nel momento in cui si ha danno al DNA e/o stimolo ipossico, con attivazione di diversi geni quali Bax, Noxa, p53AIP1, e PUMA, che inducono il mitocondrio al rilascio di Citocromo C. Un ulteriore importante effettore in questo contesto si è visto essere il pathway di Notch, in particolare Notch1, che si è dimostrato essere strettamente correlato all'attivazione di p53 e di Nf-Kb. La necrosi è una forma di morte cellulare non programmata, principalmente indotta dalla

deplezione di ATP. Tuttavia, recenti studi hanno rivelato che esistono meccanismi molecolari regolati anche in questo tipo di morte cellulare. In particolare, la segnalazione mediata da TNFα coinvolge RIPK1, RIPK3 e MLKL (Mixed Lineage Kinase Domain-Like protein), i principali mediatori della necrosi regolata, responsabili della formazione di complessi intracellulari che attivano il processo.

Altre forme di morte cellulare programmata sono coinvolte nella patogenesi dell'ictus ischemico, in particolare nella penombra ischemica, come la piroptosi e ferroptosi.

La piroptosi che è una morte cellulare pro-infiammatoria, caratterizzata da rigonfiamento cellulare e rilascio di contenuto citoplasmatico. È mediata dall'attivazione della caspasi-1 e dalla formazione dell'inflammosoma, che promuovono la secrezione di IL-1β e IL-18, amplificando la risposta infiammatoria locale.

La ferroptosi è una morte cellulare dipendente dal ferro e regolata dalla perossidazione lipidica. L'attivazione della ferroptosi è favorita dalla riduzione dell'attività della glutatione perossidasi 4 (GPX4) e della produzione di glutatione (GSH), contestualmente all'aumento dei livelli intracellulari di ferro, spesso correlato alla disfunzione della barriera emato-encefalica. (Qin et al., 2022)

2.3.4 Neuroinfiammazione e alterazione della barriera emato-encefalica

L'infiammazione è un fattore chiave nella storia naturale dell'ictus. Il fattore scatenante iniziale è la liberazione di DAMPs (tra cui adenosina, Heat Shock Proteins, HMBG1, e IL-33) da parte delle cellule morte. Questi ligandi sono riconosciuti da cellule dell'immunità, quali cellule della microglia, macrofagi, linfociti T, che vengono attivate tramite diversi pathways.

La grande quantità di citochine pro-infiammatorie e di molecole di adesione porta a due conseguenze fondamentali: la permeazione a livello del parenchima cerebrale di ulteriori cellule dell'immunità grazie a chemochine come MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-1) e alla alterazione della barriera ematoencefalica causata dall'attivazione delle cellule endoteliali e dei periciti causata da VWF (Fattore di Von

Willebrand) e Nerve Growth Factor. Questi cambiamenti, associati anche ad una sovraespressione di Acquaporina 4, conducono alla formazione dell'edema cerebrale. (Qin et al., 2022)

Un altro effettore in questo processo, si sono dimostrate essere le Metalloproteasi (MMP). In particolare MMP9 e MMP12, inducono la distruzione della barriera ematoencefalica e una down-regolazione di MMP12 in modelli animali ha dimostrato correlarsi ad una riduzione della gravità dei sintomi. (Rosenberg et al., 2017)

3. Clinica dell'ictus ischemico

La sintomatologia compare in modo acuto e dipende essenzialmente dall'area cerebrale colpita; dunque, la clinica di presentazione è suggestiva sia dell'emisfero che del lobo maggiormente interessato. Solitamente i deficit raggiungono il massimo grado di gravità fin da subito, in altri rari casi si può assistere ad una evoluzione della sintomatologia, in peggio, entro 24-48 ore dalla comparsa dei primi sintomi.

L'ictus deve essere preso in considerazione in qualsiasi paziente che si presenti con un deficit neurologico acuto oppure con una alterazione dello stato di coscienza. Non esistono elementi sintomatici in grado di distinguere con certezza l'ictus ischemico da quello emorragico, nonostante nausea, vomito, cefalea e una variazione improvvisa dello stato di coscienza siano più frequentemente associati agli ictus emorragici. (Ischemic Stroke Clinical Presentation: History, Physical Examination. https://emedicine.medscape.com/article/1916852-clinical?form=fpf)

Il sospetto di ictus deve essere posto in presenza di pazienti che manifestano uno o più tra i seguenti segni e sintomi, tra cui i più comuni:

- Emiparesi
- Deficit sensitivi emisomatici
- Alterazioni visive monoculari o binoculari
- Deficit del campo visivo
- Diplopia
- Disartria
- Asimmetria facciale
- Atassia
- Vertigini
- Afasia
- Alterazione dello stato di coscienza

Le sindromi cliniche derivanti possono essere suddivise in 4 classi in base alla classificazione di Bamford, anche conosciuta come classificazione di Oxford:

- TACS/TACI: Ictus/stroke totale della circolazione anteriore che interessa le regioni vascolarizzate dalla arteria cerebrale media e anteriore. Per la diagnosi di TACI devono essere contemporaneamente presenti: emiparesi controlaterale estesa a volto, arti superiori o inferiori, emianopsia omonima e sintomi corticali come neglect o afasia.
- PACS/PACI: Ictus o stroke parziale della circolazione anteriore che rappresenta una forma più lieve della precedente, pur interessando le stesse arterie. Si manifesta con almeno due dei sintomi precedenti oppure con la sola presenza di sintomi corticali maggiori.
- POCS/POCI: Ictus/stroke della circolazione posteriore che interessa tronco encefalico o cervelletto. Per la diagnosi deve essere presente almeno uno tra: paralisi di un nervo cranico associata a deficit motorio e/o sensitivo controlaterale, deficit motorio e/o sensitivo bilaterale, alterazioni dei movimenti oculari, disfunzione cerebellare (es. vertigini, nistagmo o atassia), emianopsia omonima isolata.
- LACS/LACI: Ictus/stroke lacunare, che interessa piccoli vasi e di conseguenza ha dimensioni ridotte. Solitamente non interessa le funzioni corticali maggiori e per la diagnosi deve essere presenta una presentazione clinica tra: Ictus sensitivo puro, ictus motorio puro, ictus sensitivo-motorio o emiparesi atassica. (Bamford et al., 1991)

Gli stroke mimics sono delle condizioni che mimano la sintomatologia dell'ictus e perciò vanno in diagnosi differenziale con esso. Uno studio ha riportato che il 19% dei pazienti a cui i neurologi avevano inizialmente diagnosticato un ictus ischemico acuto, prima dell'esecuzione della TC cranica, presentava in realtà cause non cerebrovascolari. Le condizioni che più frequentemente imitano un ictus (stroke mimics) includono:

- Crisi epilettica (17%)
- Infezione sistemica (17%)
- Tumore cerebrale (15%)
- Disturbi tossico-metabolici, come iponatriemia e ipoglicemia (13%)

- Vertigine posizionale (6%) (Ischemic Stroke Clinical Presentation: History, Physical Examination. https://emedicine.medscape.com/article/1916852-clinical?form=fpf)

La gravità della sintomatologia può essere valutata tramite l'esame obiettivo neurologico e l'assegnazione di un punteggio sulla scala NHISS (National Institutes of health Stroke Scale). Questa scala permette di valutare la presenza e la gravità dei sintomi tipici dell'ictus nei diversi distretti andando ad attribuire un punteggio di 0 se la funzionalità di quest'ultimo non risulta intaccata, fino ad un massimo di 3 se vi è la presenza di un deficit o alterazione totale. Il punteggio può quindi variare da un minimo di 0 punti, dunque assenza di alterazioni neurologiche, ad un massimo di 42.

La scala viene interpretata in 4 differenti fasce dove:

- Da 1 a 4: ictus di lieve entità
- Da 5 a 15: ictus di entità moderata
- Da 16 a 20: ictus di entità moderato/grave
- Da 21 a 42: ictus di entità grave. (Brott et al., 1989)

L'utilità di questa valutazione è innanzitutto quella di capire la gravità all'esordio, ma anche di notare eventuali peggioramenti nel tempo; viene inoltre utilizzata per la scelta della terapia e per valutarne l'efficacia a posteriori. (Brott et al., 1989)

Table 1
National Institutes of Health stroke scale score

1a. Level of consciousness	0 = Alert; keenly responsive 1 = Not alert, but arousable by minor stimulation 2 = Not alert; requires repeated stimulation 3 = Unresponsive or responds only with reflex
1b. Level of consciousness questions: What is the month? What is your age?	0 = Both answers correct 1 = Answers 1 question correctly 2 = Answers 2 questions correctly
1c. Level of consciousness commands: Open and close your eyes Grip and release your hand	0 = Performs both tasks correctly 1 = Performs 1 task correctly 2 = Performs neither task correctly
2. Best gaze	0 = Normal 1 = Partial gaze palsy 2 = Forced deviation
3. Visual	0 = No visual loss 1 = Partial hemianopia 2 = Complete hemianopia 3 = Bilateral hemianopia
4. Facial palsy	0 = Normal symmetric movements 1 = Minor paralysis 2 = Partial paralysis 3 = Complete paralysis of 1 or both sides
5. Motor arm 5a. Left arm 5b. Right arm	0 = No drift 1 = Drift 2 = Some effort against gravity 3 = No effort against gravity; limb falls 4 = No movement
6. Motor leg 6a. Left leg 6b. Right leg	0 = No drift 1 = Drift 2 = Some effort against gravity 3 = No effort against gravity 4 = No movement
7. Limb ataxia	0 = Absent 1 = Present in 1 limb 2 = Present in 2 limbs
8. Sensory	0 = Normal; no sensory loss 1 = Mild-to-moderate sensory loss 2 = Severe to total sensory loss
9. Best language	0 = No aphasia; normal 1 = Mild to moderate aphasia 2 = Severe aphasia 3 = Mute, global aphasia
10. Dysarthria	0 = Normal 1 = Mild to moderate dysarthria 2 = Severe dysarthria
11. Extinction and inattention	0 = No abnormality 1 = Visual, tactile, auditory, spatial, or personal inattention 2 = Profound hemi-inattention or extinction
Total score = 0–42	

Figura 3: Scala NHISS (https://pbrainmd.wordpress.com/2015/05/04/nih-stroke-scale-nihss/)

4. Diagnosi di ictus

La diagnosi precoce è un aspetto fondamentale nell'ictus per la possibilità di salvaguardare il tessuto della penombra ischemica e garantire un recupero ottimale. Secondo le linee guida, il "door to needle time", quindi il tempo dall'ammissione alla terapia con fibrinolitico, dovrebbe essere inferiore ai 60 minuti.

La fase iniziale della valutazione del paziente con sintomatologia compatibile con ictus è la stabilizzazione e valutazione dei parametri vitali, con particolare attenzione alle vie aeree, alla respirazione e alla circolazione che potrebbero risultare alterate a causa dell'ipertensione endocranica conseguente all'esteso edema cerebrale.

Per la diagnosi, alcuni esami strumentali e/o ematici possono risultare utili come elettrocardiogramma, dosaggio della troponina, emocromo completo, elettroliti, azotemia, creatinina e fattori della coagulazione. L'elettrocardiogramma e la troponina vengono valutati in quanto l'ictus può associarsi a cardiopatica ischemica, condividendo inoltre fattori di rischio sovrapponibili. Emocromo ed elettroliti sono utili per escludere infezioni o disionie, compatibili con alterazioni neurologiche. Azotemia e creatinina sono indicati per valutare la possibilità di utilizzare il mezzo di contrasto nell'imaging. I fattori della coagulazione, PT (tempo di protrombina) e aPTT (tempo di tromboplastina parziale attivata) possono suggerire la presenza di un ictus di tipo emorragico. (Laurent et al., 2025)

Tuttavia, la diagnosi di certezza viene posta tramite l'imaging, in particolare tramite tomografia computerizzata in acuto.

4.1 TC nell'ictus

La tomografia computerizzata (TC) svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi di ictus e nella diagnosi differenziale tra le due forme (ischemica ed emorragica), sia nelle fasi di acuzie, sia nelle fasi tardive e croniche per il monitoraggio. È una tecnica rapida, poco costosa e più spesso disponibile rispetto alla Risonanza Magnetica (RM). Sebbene quest'ultima offra una sensibilità maggiore, i tempi prolungati di acquisizione delle immagini e la ridotta disponibilità, non la rendono una metodica adatta alla

diagnosi in acuto, in quanto il trattamento deve essere tempestivo per assicurare il migliore outcome possibile. (Nukovic et al., 2023)

4.1.1 TC senza mezzo di contrasto in acuto

Questa metodica permette di effettuare, in primo luogo, la diagnosi differenziale tra forme ischemiche ed emorragiche; nel primo caso si possono osservare segni tipici quali ipodensità focali, iperdensità all'interno del vaso colpito, la scomparsa dei solchi cerebrali, il "ribbon sign" e la scomparsa dei gangli della base (Figura 1), mentre nel secondo si osservano ampie aree iperdense dovute all'emorragia. (Figura 2)

L' ipodensità focale è il risultato dell'aumento del contenuto di acqua dovuto all'edema, che comporta inoltre una riduzione della differenziazione tra materia bianca e grigia.

L'iperdensità all'interno dell'arteria è da attribuire alla presenza del trombo o embolo. Nonostante spesso non sia osservabile subito dopo la comparsa della sintomatologia, è altamente specifico.

La scomparsa dei solchi cerebrali è presente nel 33% dei casi ed indica un ictus parzialmente superficiale. La sua presenza è dovuta all'edema. In assenza di altri segni è un fattore prognostico positivo per terapia con fibrinolisi.

L'insular ribbon sign è la riduzione del contrasto tra la sostanza bianca e grigia a livello dell'insula, dovuto al fatto che questa zona è vascolarizzata primariamente dalla arteria cerebrale media (MCA) e in caso di sua ostruzione è frequentemente interessata.

La scomparsa dei gangli della base è dovuta al fatto che essi sono irrorati da arterie terminali, dunque risultano più suscettibili all'ischemia.



Figura 4: Aspetto alla TC senza mezzo di contrasto di due regioni di ischemia cerebrale localizzate nel territorio dell'arteria cerebrale media sinistra, interessando le aree vascolarizzate dai rami anteriori e posteriori. (https://radiopaedia.org/cases/ischemic-stroke-2)



Figura 5: Aspetto alla TC senza mezzo di contrasto di un ictus emorragico del lobo frontale con interessamento del ventricolo ed effetto massa.
(https://radiopaedia.org/cases/lobar-haemorrhage)

Alla diagnosi di ictus ischemico è fondamentale valutare l'ASPECTS Score (Alberta Stroke Program Early CT Score). Si tratta di uno score quantitativo che predice la prognosi del paziente in base all'interessamento dei territori vascolarizzati dalla MCA ed è stato aggiustato anche per la circolazione posteriore prendendo il nome di pc-ASPECTS. Il calcolo dello score prevede la sottrazione di un punto, partendo da un massimo di dieci, per ogni territorio interessato tra caudato, putamen, capsula interna, corteccia insulare, M1 (opercolo frontale), M2 (porzione anteriore del lobo temporale), M3 (porzione posteriore del lobo temporale), M4 (territorio della MCA superiormente a M1), M5 (territorio della MCA superiormente a M2), M6 (territorio della MCA superiormente a M3). (Figura 3). Per un lungo periodo è stata proposta una valutazione dicotomica del punteggio ottenuto con un cut-off a 7, dove punteggio uguali o inferiori correlavano con una prognosi peggiore a 30 giorni e un maggior rischio di infarcimento emorragico in seguito a trattamento; recenti studi hanno invece dimostrato una relazione lineare. Nonostante ancora non vi siano evidenze precise sul valore oltre il quale la fibrinolisi non sarebbe indicata, rimane un buon predittore di prognosi e rischio di emorragia. (Nukovic et al., 2023)



Figura 6: Localizzazione dei diversi territori valutati nel calcolo dell'ASPECTS. (https://radiopaedia.org/cases/middle-cerebral-artery-territory-in-aspects-study-1)

4.1.2 TC senza mezzo di contrasto in fase subacuta e cronica

In fase subacuta si ha quello che è definito TC fogging. In un primo momento, corrispondente alla prima settimana dall'acuzie, si ha una demarcazione dell'area interessata e aumento dell'edema, che comporta una compressione sul ventricolo omolaterale; successivamente si osserva un processo di riassorbimento dell'edema e un guadagno di densità da parte del parenchima, si pensa dovuto a processi quali migrazione di macrofagi e leucociti e stravaso di emazie dai capillari danneggiati. (Figura 4)

Figura 7: Aspetto alla TC senza mezzo di contrasto di un esteso infarto di aspetto subacuto nel territorio dell'arteria cerebrale media sinistra (https://radiopaedia.org/cases/subacute-left-middle-cerebral-artery-infarct#image-12267308)

Dopo di che, a distanza di 2-3 settimane dall'evento acuto, il tessuto riacquisisce un aspetto simil fisiologico all'imaging, potendo condurre a diagnosi errate o a mancato riconoscimento dell'evento ischemico. In queste fasi può essere utile effettuare una TC con contrasto, in quanto i neo-vasi e/o i vasi danneggiati non possiedono una barriera ematoencefalica integra, risultando in una presa di contrasto della lesione. (Becker et al., 1979)

In cronico, il tessuto cerebrale necrotico è riassorbito e sostituito da liquido cefalorachidiano. In aggiunta, si osservano gliosi e poroencefalia, rispettivamente proliferazione di cellule gliali e formazioni di cavità all'interno dell'emisfero interessato, i quali assumono alla TC un aspetto francamente ipodenso. A causa della diminuzione della pressione sui ventricoli, essi potrebbero risultare espansi verso l'emisfero colpito e, in alcuni casi, comunicanti con le cavità formatesi. (Figura 5)

Figura 8: Aspetto alla TC senza mezzo di contrasto di un infarto cronico nel territorio dell'arteria cerebrale media sinistra, senza trasformazione emorragica (https://radiopaedia.org/cases/ischaemic-stroke-chronic-2?lang=us)

4.1.3 Angio-TC

Nella diagnosi di ictus ischemico di vitale importanza è definire il sito di occlusione del vaso mediante angio-TC in modo da pianificare il trattamento. Siccome è accurata nel rilevare trombi di grandi dimensioni nelle arterie cerebrali prossimali, è utile per identificare quelle occlusioni che potrebbero risultare resistenti alla lisi enzimatica indotta dalla trombolisi endovenosa.

La vascolarizzazione cerebrale viene suddivisa in una componente anteriore ed una posteriore: la prima comprende l'arteria cerebrale anteriore (ACA), l'arteria cerebrale media (MCA) e l'arteria carotide interna (ICA); la seconda l'arteria cerebrale posteriore (PCA), le arterie cerebellari, l'arteria vertebrale (VA) e l'arteria basilare (BA).

L'arteria più frequentemente interessata è la MCA i cui confini si estendono dal solco frontale superiore fino al giro occipitale medio; le strutture coinvolte includono la porzione anteriore del giro frontale medio, il giro angolare, parti del lobo parietale

posteriore, il giro occipitale inferiore, il putamen, il globo pallido e l'insula. Per lo studio radiologico, l'MCA si suddivide in quattro segmenti:

- M1: segmento sfenoidale o orizzontale, origina dalla biforcazione carotidea e si estende lateralmente fino alla scissura di Silvio, dove si divide in due tronchi che, a livello del limen insulae, compiono una flessione di 90°.
- M2: segmento insulare, che decorre nell'insula fino al solco circolare insulare;
- M3: segmento opercolare, che origina dal solco circolare e si estende lungo gli opercoli fronto-parietale e temporale;
- M4: segmenti corticali, che si dirigono verso la superficie corticale terminando in direzione superiore o inferiore.

L'angio-TC assume un ruolo clinicamente rilevante nella selezione del trattamento riperfusivo nei pazienti con ictus ischemico, poiché la sede e la dimensione dell'occlusione rappresentano un criterio fondamentale nella scelta della terapia. Le occlusioni arteriose prossimali e di grosso calibro (ICA, M1, M2 o BA) sono associate a prognosi sfavorevole e minore tasso di ricanalizzazione con trombolisi endovenosa. In questi casi, la trombectomia meccanica rappresenta l'opzione terapeutica più indicata. (Nukovic et al., 2023)

Tramite angio-TC può essere valutata anche la presenza ed efficacia dei circoli collaterali, fondamentale in quanto la loro presenza mantiene vitale il tessuto ed amplia la finestra terapeutica con esiti migliori. Per questa valutazione viene utilizzata l'angio-TC multifasica, dimostratasi superiore rispetto alla monofasica, che permette di visualizzare i vasi nella zona interessata in tre momenti diversi: picco arterioso, picco venoso e venoso tardivo. (Figura 6, 7) Grazie a questa tecnica è possibile stimare il "multiphase CT angiography (mCTA) collateral score": è uno score che valuta la qualità e quantità dei circoli collaterali. Il punteggio va da un minimo di 0 ad un massimo di 5 dove:

- **5**: nessun ritardo di riempimento rispetto all'emisfero controlaterale, vasi piali normali nell'emisfero interessato

- **4**: ritardo di riempimento di una fase nell'emisfero interessato, ma estensione e prominenza dei vasi piali sovrapponibili al controlaterale.
- **3**: ritardo di riempimento di due fasi nell'emisfero interessato, oppure ritardo di una fase con riduzione significativa del numero di vasi nel territorio ischemico.
- **2**: ritardo di riempimento di due fasi nell'emisfero interessato con riduzione significativa del numero di vasi nel territorio ischemico, oppure ritardo di una fase con aree prive di vasi visibili.
- **1**: solo pochi vasi visibili nell'emisfero interessato in qualsiasi fase.
- **0**: assenza di vasi visibili nell'emisfero interessato in qualsiasi fase. (Garcia-Tornel et al., 2016 - Menon et al., 2015)

L'angio-TC è utile anche per la valutazione del CTA-SI ASPECTS (CT Angiography source images ASPECTS), che è risultato un predittore migliore di outcome e di volume finale dell'area infartuate rispetto allo stesso score valutato su TC senza mezzo di contrasto. (Bhatia et al., 2011- Park et al., 2019)



Figura 9: fase arteriosa in AngioTC in cui vi è la presenza di un'occlusione completa di ICA e MCA di destra. Il valore del CTA-SI ASPECTS risulta di 0, in netto contrasto con quello valutato alla TC senza mezzo di contrasto, il cui valore è di 7. (https://radiopaedia.org/cases/mca-ischemic-stroke-added-value-of-cta-source-image-aspects)



Figura 10: fase tardiva in AngioTC in cui si evidenza la scarsità di collaterali nell'emisfero colpito; l'mCTA collateral score in questo caso è di 0 indicando una cattiva prognosi. (https://radiopaedia.org/cases/mca-ischemic-stroke-added-value-of-cta-source-image-aspects)

4.1.4 TC Perfusionale

Oltre ad essere uno strumento diagnostico, la TC perfusionale riveste un ruolo fondamentale nella selezione dei pazienti candidabili alla terapia di riperfusione, poiché è in grado di valutare diversi parametri: il tempo medio di transito (Mean Transit Time: MTT), tempo di picco (Time to Peak: TTP), il flusso ematico cerebrale (Cerebral Blood Flow: CBF) e il volume ematico cerebrale (Cerebral Blood Volume: CBV). Essa consente una delimitazione accurata del core ischemico e dell'area di penombra, permettendo così di visualizzare le zone di tessuto potenzialmente recuperabili con terapia. Il calcolo di questi parametri avviene mediante la valutazione della dinamica di passaggio del mezzo di contrasto attraverso i vasi cerebrali.

I parametri che ne derivano sono:

- CBF: il volume di sangue che attraversa una determinata unità di massa cerebrale in un'unità di tempo, espresso in mL/100 g/min.
- CBV: indica la frazione vascolarizzata del tessuto, ed è riportato in millilitri/100g.
- MTT: rappresenta il tempo medio impiegato dal contrasto per attraversare il letto capillare; è espresso in secondi. Questo parametro è dipendente dai due precedenti (CBF e CBV), secondo la formula: MTT = CBV/CBF.
- TTP: indica il tempo medio necessario affinché il mezzo di contrasto raggiunga la sua massima concentrazione nell'area di interesse.

Tramite questi valori è possibile valutare la differenza tra il core ischemico e la penombra ischemica. Nel primo caso si ha una riduzione importante del valore di CBF (<10-12 ml/100g/min) e CBV (<2 ml/100g) con aumento di MTT e TTP (Figura 8); nel secondo caso invece CBF e CBV risultano minimante alterati con un aumento di MTT e TTP. (Figura 9) La valutazione delle due aree consente di trattare anche quei pazienti che si presentano oltre la finestra temporale classica per la terapia di riperfusione (>4,5 ore per la trombolisi endovenosa e >6 ore per la trombectomia meccanica). (Nukovic et al., 2023)



Figura 11: Aspetto del core ischemico alla TC perfusionale. (https://radiopaedia.org/cases/ischaemic-penumbra-and-core-infarct-in-ct-perfusion)



Figura 12: Aspetto della penombra ischemica alla TC perfusionale. (https://radiopaedia.org/cases/ischaemic-penumbra-and-core-infarct-in-ct-perfusion)

4.2. Risonanza Magnetica nell'ictus ischemico

Sebbene la RM presenti una maggiore specificità e sensibilità rispetto alla TC, non viene comunemente utilizzata come metodica di prima scelta nella diagnosi dell'ictus ischemico acuto. Ciò è dovuto principalmente al costo più elevato, ai tempi di acquisizione più lunghi e alla minore disponibilità. Per questi motivi, l'utilizzo della RM nella fase iniziale dell'ictus ischemico acuto è limitato e riservato a indicazioni particolari. Tuttavia, superata la fase d'urgenza, la RM cerebrale può fornire informazioni diagnostiche più precise utili alla gestione clinica successiva. Oltre alle sequenze standard come TI e T2, possono risultare utili ulteriori metodiche come la Diffusion Weighted Imaging (DWI), la Perfusion Weighted Imaging (PWI), la Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR), la RM funzionale (fMRI), la Time of Flight (TOF) e l'angiografia a RM (MRA).

Le sequenze T1 e T2 pesate rappresentano le sequenze convenzionali che fanno parte di tutti i protocolli RM e permettono di visualizzare lo stato dei tessuti con un dettaglio superiore rispetto alla TC. Nelle immagini T1-pesate, i tessuti contenenti acqua appaiono ipointensi, mentre i tessuti ricchi di grasso appaiono iperintensi. Nelle immagini T2-pesate, al contrario, i tessuti contenenti acqua o fluidi risultano iperintensi, mentre quelli contenenti grasso appaiono ipointensi. Le immagini T1-pesate sono indicate per una visualizzazione dettagliata dell'anatomia, mentre le immagini T2-pesate sono utili per l'identificazione di tumori, edema, infarti o processi infiammatori, pertanto quest'ultima sequenza permette, nel contesto dell'ictus ischemico, di visualizzare l'edema. (Nukovic et al., 2023)

La Diffusion-Weighted Imaging (DWI) è una tecnica avanzata di risonanza magnetica che consente di misurare la diffusione delle molecole d'acqua all'interno dei tessuti. (Nukovic et al., 2023). La DWI è estremamente sensibile nel rilevare l'ictus ischemico acuto, grazie alla sua capacità di evidenziare l'edema citotossico, che appare iperintenso, già pochi minuti dopo l'esordio dei sintomi. Rispetto ad altre sequenze, come la Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR), la DWI è in grado di identificare un infarto cerebrale in fase molto precoce. Infatti, mentre la DWI può mostrare alterazioni entro pochi minuti dall'evento ischemico, la sequenza FLAIR può richiedere fino a 4,5 ore per evidenziare i segni di un infarto cerebrale. Quando la DWI risulta positiva e la FLAIR risulta ancora negativa, si può ragionevolmente ipotizzare che l'ictus sia avvenuto da meno di 4,5 ore. (Laurent et al., 2025)

Per migliorare l'accuratezza diagnostica, la DWI viene frequentemente associata alla Perfusion Weighted Imaging (PWI). La PWI consente di valutare la perfusione cerebrale attraverso l'analisi di parametri emodinamici come il tempo medio di transito (Mean Transit Time, MTT), il flusso ematico cerebrale (Cerebral Blood Flow, CBF) e il volume ematico cerebrale (Cerebral Blood Volume, CBV). Il concetto di mismatch DWI/PWI viene utilizzato per identificare la presenza di un'area di maggiori dimensioni che rappresenta la penombra ischemica, la quale risulta ipoperfusa nella sequenza PWI, e del core ischemico, di dimensioni ridotte nella sequenza DWI, dove la diffusione è minore rispetto al tessuto sano. (Figura 10) Tale criterio è utilizzato per

la selezione dei pazienti candidabili alla trombolisi e/o trombectomia, oltre a fornire una previsione dell'estensione finale dell'infarto. (Nukovic et al., 2023)



Figura 13: Mismatch PWI/DWI. (https://www.stroke-manual.com/ischemic-penumbra/)

Oltre che per la diagnosi di ictus, la risonanza magnetica è utile anche nella valutazione della prognosi dei pazienti colpiti da ictus mediante fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging). La fMRI misura l'attività neuronale valutando il flusso ematico cerebrale attraverso il metodo del contrasto dipendente dal livello di ossigenazione del sangue (BOLD – Blood Oxygen Level Dependent). Questa tecnica di imaging sfrutta la correlazione tra l'attivazione neuronale e il flusso sanguigno cerebrale, ed è utilizzata per studiare l'anatomia funzionale del cervello e per mappare l'attività cerebrale. Inoltre, può fornire informazioni utili sui meccanismi di recupero delle funzioni perse a seguito di ictus o trauma cranico. (Kakkar et al., 2021)

La sequenza Time of Flight (TOF) viene utilizzata per identificare la sede di occlusione dei vasi. Essa presenta un'elevata sensibilità e specificità nel rilevare l'assenza di flusso ematico; tuttavia, è soggetta al rischio di artefatti, poiché il segnale è generato dal flusso sanguigno stesso. Un'ulteriore limitazione consiste nell'impossibilità di visualizzare direttamente il trombo. Inoltre, la sede dell'occlusione può essere

identificata erroneamente a causa della bassa sensibilità nei confronti di flussi lenti, oppure il grado di stenosi può essere sovrastimato in presenza di alterazioni emodinamiche. (Nukovic et al., 2023)

La MRA risulta particolarmente vantaggiosa nei pazienti con controindicazioni all'uso del mezzo di contrasto iodato impiegato nella Angio-TC. Tuttavia, le immagini MRA sono dipendenti dal flusso e possono risultare meno accurate rispetto all' Angio-TC, che invece fornisce una rappresentazione più fedele dell'anatomia del lume vascolare.

5. Terapia dell’ictus ischemico

L'obiettivo della terapia nell'ictus ischemico acuto è preservare il tessuto della penombra ischemica, in cui la perfusione è ridotta, ma ancora sufficiente a evitare l'infarto e la perdita irreversibile della vitalità. Il ripristino del flusso sanguigno può ridurre al minimo gli effetti dell’ischemia solo se eseguito rapidamente, in caso contrario si osservano alterazioni sovrapponibili a quelle del core ischemico anche nella zona di penombra. Le strategie di ricanalizzazione includono la somministrazione endovenosa di attivatore tissutale del plasminogeno ricombinante (rtPA), iniezione intrarteriosa di fibrinolitico e la trombectomia meccanica. Oltre alla terapia riperfusiva, nel management dell’acuzie rientrano anche terapie di supporto per la gestione delle comorbidità ed altri fattori. (Laurent et al., 2025)

5.1 Terapia fibrinolitica

I criteri di inclusione delineati dall’American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) per la somministrazione di fibrinolitico sono le seguenti:

- Diagnosi di ictus ischemico con deficit neurologico misurabile
- I segni neurologici non si risolvono spontaneamente
- I segni neurologici non sono lievi né isolati
- I sintomi non sono suggestivi di emorragia subaracnoidea
- Nessun trauma cranico o ictus precedente negli ultimi 3 mesi
- Nessun infarto miocardico (IM) negli ultimi 3 mesi
- Nessuna emorragia gastrointestinale o genitourinaria nei 21 giorni precedenti
- Nessuna puntura arteriosa in un sito non comprimibile nei 7 giorni precedenti
- Nessun intervento chirurgico maggiore negli ultimi 14 giorni
- Nessuna storia di emorragia intracranica pregressa
- Pressione arteriosa sistolica inferiore a 185 mmHg e diastolica inferiore a 110 mmHg
- Assenza di trauma acuto o sanguinamento in corso

- Il paziente non deve assumere anticoagulanti orali oppure, nel caso li assuma, l'INR (International Normalized Ratio) deve essere inferiore a 1,7
- Se ha assunto eparina nelle 48 ore precedenti, l' aPTT deve essere normale
- Conta piastrinica superiore a 100.000/μL
- Glicemia superiore a 50 mg/dL (2,7 mmol/L)
- La TC cerebrale non mostra segni di infarto superiore a un terzo dell'emisfero cerebrale né di emorragia intracerebrale. (Powers et al 2018 Guidelines for Management of Acute Ischemic Stroke e47. - https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000158)

L'American Heart Association (AHA) e l'American Stroke Association (ASA) raccomandano l'utilizzo di Alteplase nei pazienti con esordio della sintomatologia entro 3 ore, in dose di 0.9 mg/kg fino ad un massimo di 90mg, di cui un 10% del totale in bolo mentre il restante 90% successivamente in infusione continua nell'arco di 60 minuti. (Laurent et al., 2025)

Una alternativa all'Alteplase è il Tecneteplase. Presenta alcuni vantaggi, tra cui un'emivita più lunga e la possibilità di somministrarlo esclusivamente in bolo, senza necessità di effettuare una infusione continua, alla dose di 0.25-0.4 mg/kg. Studi recenti hanno dimostrato che il Tecneteplase presenta profili di efficacia e sicurezza simili a quelli dell'Alteplase. Le linee guida AHA del 2023 indicano che scegliere il Tecneteplase al posto dell'Alteplase nei pazienti senza controindicazioni alla fibrinolisi EV e che sono anche candidati alla trombectomia meccanica può essere una scelta ragionevole. (Laurent et al., 2025)

La tempistica con cui questa terapia deve essere somministrata è idealmente di 3 ore dalla comparsa della sintomatologia, ma grazie a diversi studi è stato dimostrato che si hanno miglioramenti nella clinica anche somministrandola entro le 4,5 ore. Valutando la mRS (modified Rankin Scale) e definendo come buon outcome uno score di 0 o 1 punti, si è visto che anche nella finestra tra le 3 e le 4,5 ore si ha una probabilità del 26% maggiore di avere un outcome migliore in pazienti che abbiano ricevuto la terapia rispetto a coloro a cui non è stata somministrata. Durante questa finestra però si hanno dei criteri di esclusione più stringenti:

- Età superiore ad 80 anni
- Utilizzo di anticoagulanti orali, indipendentemente dal valore dell'INR
- Punteggio di partenza sulla scala NHISS superiore a 25
- Storia pregressa di ictus e/o diabete.

Il principale effetto collaterale di questo approccio è l'emorragia intracerebrale. Uno studio in particolare ha dimostrato come i pazienti che, precedentemente all'ictus, assumevano terapia antiaggregante, avessero un miglior outcome terapeutico ma allo stesso tempo un maggior rischio di emorragia intracranica. (Turc et al., 2019). Di conseguenza, la terapia fibrinolitica deve essere somministrata con cautela in questi paziente ed anche in pazienti la cui area ipodensa coinvolge più di un terzo del territorio di vascolarizzazione dell'arteria cerebrale media. (Ischemic Stroke Treatment & Management: Approach Considerations, Emergency Response and Transport, Acute Management of Stroke - https://emedicine.medscape.com/article/1916852-treatment)

5.2 Trombectomia meccanica

La trombectomia meccanica è attualmente riconosciuta come standard terapeutico nella gestione dell'ictus ischemico acuto da occlusione di grossi vasi. Questa tecnica si basa sull'utilizzo di dispositivi stent retriever e tecniche di aspirazione, ma sono state riportate numerose varianti e combinazioni tra queste metodiche. Poiché si tratta di un campo in rapida evoluzione nella gestione dell'ictus, è ancora oggetto di dibattito se una tecnica sia effettivamente superiore alle altre in termini di esiti clinici. (Munoz et al., 2022)

Le attuali linee guida dell'American Heart Association (AHA) e dell'American Stroke Association (ASA), grazie a studi come DAWN e DEFUSE-3, allargano la finestra temporale di trattamento con trombectomia dalle precedenti 6 ore alle 24 in pazienti selezionati tramite imaging e ne raccomandano l'utilizzo prima delle 6 ore in paziente con controindicazioni alla fibrinolisi. (Ischemic Stroke Treatment & Management:

Approach Considerations, Emergency Response and Transport, Acute Management of Stroke - https://emedicine.medscape.com/article/1916852-treatment).

I pazienti che dovrebbero essere considerati candidati per trombectomia entro 6 ore dall'esordio dell'ictus sono quelli che presentano un trombo in uno dei grossi vasi e soddisfano i seguenti criteri:

- Punteggio pre-ictus mRS compreso tra 0 e 1
- Occlusione dell'arteria carotide interna o del segmento M1 dell'arteria cerebrale media
- Età superiore a 18 anni
- Punteggio NIHSS pari o superiore a 6
- Punteggio ASPECTS pari o superiore a 6. [23]

Le raccomandazioni delle linee guida della European Stroke Organization affermano che:

- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore insorta da meno di 6 ore è raccomandata la trombectomia meccanica associata a terapia di supporto
- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore insorta da 6 a 24 ore e che rientrano nei criteri degli studi DAWN e DEFUSE3 è indicata la trombectomia meccanica e terapia di supporto.
- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore sono indicate sia la trombectomia meccanica e la fibrinolisi.
- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore con età superiore ad 80 anni è indicata trombectomia meccanica entro le 6 ore dalla comparsa dei sintomi e terapia di supporto.
- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore nella finestra 0-6 ore e senza evidenza di esteso core ischemico è indicata la trombectomia meccanica e la terapia di supporto (compresa la fibrinolisi se presenti indicazioni).
- In pazienti con occlusione di vasi di grosso calibro nella circolazione anteriore nella finestra 6-24 ore che rientrano nei criteri dello studio DAWN e DEFUSE-3 è

indicata trombectomia meccanica e la terapia di supporto (compresa la fibrinolisi se presenti indicazioni). (Turc et al., 2019)

5.2.1 Tipologie di cateteri utilizzati nella trombectomia meccanica

Con la trombectomia meccanica ormai affermata come standard di trattamento, si sta assistendo ad un crescente interesse verso l'innovazione dei dispositivi e delle tecniche utilizzate per la trombectomia, nonché al miglioramento degli esiti nella gestione dell'ictus. L'ottenimento di una ricanalizzazione rapida e completa dell'arteria interessata è fondamentale per garantire una migliore prognosi dei pazienti colpiti.

Le principali tecniche di trombectomia meccanica prevedono l'utilizzo di stent retriever per l'estrazione del trombo oppure di un catetere di grosso calibro per l'aspirazione del coagulo; in alcune tipologie di catetere le due modalità vengono combinate e possono anche essere associate all'utilizzo di cateteri dotati di palloncini gonfiabili in modo da arrestare il flusso e prevenire l'embolizzazione distale durante la rimozione del catetere stesso. (Munoz et al., 2022)

Tutte le metodiche prevedono l'accesso tramite arteria, in genere la femorale, per poi risalire verso aorta, carotide giungendo quindi nella arteria interessata; successivamente le diverse tecniche si differenziano in base a come il trombo viene rimosso.

Nel caso degli stent retriever viene utilizzato un catetere guida dal quale viene rilasciato poi un secondo catetere di dimensioni minori, il quale viene avanzato fino al raggiungimento dell'occlusione, la oltrepassa ed in seguito rilascia la rete autoespansiva che cattura il trombo nelle sue maglie. Dopodiché, viene retratto, rientrando nel catetere guida e viene sfilato. (Figura 11) (Munoz et al., 2022)



Figura 14: funzionamento dello stent retriever. (Munoz et al., 2022)

Per quanto riguarda invece il catetere in aspirazione, generalmente viene collegato a delle pompe o siringhe che, generando una pressione negativa all'interno del catetere, una volta che questo è giunto alla porzione più prossimale del trombo, lo aspirano. (Figura 12) (Munoz et al., 2022)



Figura 16: funzionamento del catetere in aspirazione. (Munoz et al., 2022)

Inoltre, si hanno anche sistemi misti, che combinano le due precedenti metodiche. Lo stent retriever viene rilasciato contestualmente all'attivazione dell'aspirazione e

successivamente vengono rimossi in blocco stent retriever, trombo e catetere di aspirazione tramite il catetere guida. (Figura 13) (Munoz et al., 2022)



Figura 15: funzionamento del catetere combinato. (Munoz et al., 2022)

Infine, esistono cateteri, come l'ASAP (A Stent-Retrieving into an Aspiration Catheter with Proximal Balloon Technique) che oltre alla combinazione delle due tecniche utilizzano anche il pallone occludente il flusso. (Figura 14) (Munoz et al., 2022)



Figura 17: funzionamento dell'ASAP. (Munoz et al., 2022)

5.2.2 Complicanze della trombectomia meccanica

Nonostante l'elevata efficacia, la trombectomia meccanica comporta rischi clinicamente significativi, ben documentati sia nei trial clinici sia nell'esperienza clinica quotidiana. Queste complicanze possono essere suddivise in due categorie principali:

1. Complicanze intraprocedurali: legate al sito di accesso (come lesioni vascolari, ematoma inguinale, dissecazione)

2. Complicanze post-procedurali: correlate all'ictus stesso o alla ricanalizzazione (come danno da riperfusione, edema cerebrale, emorragia cerebrale). (Krishnan et al., 2021)

L' emorragia cerebrale rappresenta la complicanza più temuta dopo trombectomia meccanica. La definizione di emorragia intracerebrale sintomatica data dal National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) include qualsiasi trasformazione emorragica correlata ad un peggioramento neurologico. Le definizioni adottate invece negli studi ECASS (European Cooperative Acute Stroke Study) e SITS-MOST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke–Monitoring Study), sono più stringenti, considerando solo le emorragie correlate ad un marcato peggioramento clinico, valutato con un incremento di 4 o più punti nella NIHSS. Il tasso di incidenza di si aggira intorno al 4,4% e il 7,6%. La sintomatologia tende a manifestarsi precocemente, entro le 24 ore dalla riperfusione e può essere diagnosticata tramite TC. (Krishnan et al., 2021)

A differenza della fibrinolisi dove l'emorragia principale che si osserva è quella intraparenchimale, nel caso della trombectomia meccanica è possibile che si verifichi anche emorragia subaracnoidea, generalmente dovuta a lesioni da penetrazione o dissezione vascolare causate dal dispositivo oppure a danni da trazione sui vasi perforanti durante il recupero degli strumenti di trombectomia dai grossi vasi del poligono di Willis. (Krishnan et al., 2021)

Sono stati proposti diversi predittori di emorragia post trombectomia meccanica. Alcune condizioni che si correlano con l'aumentato rischio sono:

- Etnia asiatica
- Ictus di origine cardioembolica
- Scarsa presenza di circoli collaterali
- Trattamento endovascolare tardivo
- Numero elevato di passaggi con dispositivi stent retriever
- Punteggio basso dell'ASPECTS prima del trattamento
- Elevati livelli di neutrofili.
- Ipertensione precedentemente la procedura
- Alto score NIHSS. (Krishnan et al., 2021 - Hao et al., 2017)

Un'altra complicanza che si può verificare in seguito a ricanalizzazione è l'edema cerebrale. Nonostante questo sia già un elemento che contraddistingue la normale patogenesi dell'ictus, in seguito a trombectomia meccanica può peggiorare ed interessare aree maggiori e portare a danno diffuso. (Krishnan et al., 2021)

Il danno da riperfusione è caratterizzato dal peggioramento della disfunzione e morte cellulare in seguito al ripristino del flusso ematico in tessuti precedentemente ischemici. Sebbene il ripristino del flusso sanguigno sia fondamentale per salvare i tessuti ischemici, la riperfusione, in alcuni casi, induce paradossalmente ulteriori danni, compromettendo la funzione e la vitalità dell'organo interessato. Questo fenomeno è stato osservato in diversi organi, tra cui cuore, polmoni, reni, intestino, muscoli scheletrici e cervello. (Mandalaneni et al., 2024)

L'embolizzazione in nuovi territori, distali all'arteria primariamente interessata, ha una incidenza tra il 2,8% e l'8,6%. È una condizione in cui si ha il distacco di emboli dalla massa principale, i quali si incuneano in arterie di più piccolo calibro che prima della procedura risultavano pervie. L'evento di per sé non rappresenta un fattore alterante l'outcome del paziente, ma lo diventa solo se si ha ischemia del tessuto interessato dalle arterie colpite, evenienza che deve essere valutata tramite TC. (Rosi et al., 2019)

Infine, si hanno le complicanze che interessano il sito di accesso, che nella maggior parte dei casi è rappresentato dall'arteria femorale. La loro frequenza in letteratura è

molto variabile, tuttavia generalmente hanno un'incidenza che varia tra l'1% e l'11%. Le principali sono:

- Ecchimosi
- Ematoma inguinale
- Sanguinamento del sito di accesso
- Dissecazione e pseudoaneurisma
- Fistola artero-venosa
- Occlusione del sito di accesso
- Ematoma retroperitoneale o della guaina del muscolo retto dell'addome
- Neuropatia femorale
- Infezione. (Krishnan et al., 2021)

5.2.3 Ricanalizzazioni futili e predittori di esito positivo

Il fenomeno delle cosiddette ricanalizzazioni futili, si riferisce a quei casi in cui, nonostante la riapertura dell'arteria cerebrale occlusa, non si osserva un miglioramento clinico né radiologico significativo. Prima dell'introduzione dei moderni criteri di selezione dei pazienti, questa condizione poteva verificarsi in circa il 50% dei casi. (Rosi et al., 2019)

Le cause fisiopatologiche alla base della mancata riperfusione del tessuto cerebrale, nonostante la ricanalizzazione, non sono ancora del tutto comprese, ma si ritiene che siano il risultato di diversi fattori interconnessi. Tra questi: una scarsa presenza di circoli collaterali, un'estensione limitata della penombra ischemica, un'alterata autoregolazione del sistema neurovascolare e un danno al microcircolo provocato da fenomeni trombotici e da alterazioni endoteliali. (Rosi et al., 2019)

In quest'ottica risulta pertanto fondamentale selezionare adeguatamente i pazienti da sottoporre alla procedura, valutando minuziosamente eventuali fattori predittivi clinici e radiologici.

Nel tempo diversi predittori sono stati proposti ed utilizzati per valutare se una riperfusione potesse avere un esito positivo, sia di tipo preprocedurale che

postprocedurale. Uno degli aspetti fondamentali da valutare, una volta avvenuta la ricanalizzazione, è la qualità di quest'ultima. Inizialmente venne proposto l'utilizzo di uno score di pertinenza cardiologica, il Thrombolysis in Myocardial Ischemia Scale (TIMI), utile nella valutazione della ricanalizzazione dopo angioplastica coronarica. Questo score è stato successivamente abbandonato in favore di altri appositi, ispirati al TIMI ma adattati alla circolazione e alla fisiologia cerebrale; infatti, il principale limite del TIMI nell'ictus è che non prende in considerazione l'estensione del tessuto riperfuso, che si correla con la dimensione finale dell'area infartuata e di conseguenza con la prognosi del paziente. (Zaidat et al., 2013)

Dal TIMI è stato derivato il TICI, che viene valutato visivamente all'angiografia in base all'aspetto del flusso nell'arteria trattata e in quelle distali a quest'ultima. Ad oggi la versione di scelta è la mTICI che si articola in quattro livelli:

- Grado 0: nessuna ricanalizzazione;
- Grado 1: lieve ricanalizzazione, con un flusso anterogrado molto lento oltre il punto di occlusione;
- Grado 2: ricanalizzazione parziale, con passaggio del contrasto oltre l'occlusione ma riempimento distale incompleto o rallentato. Questo grado si suddivide in:
    - 2a: se la riperfusione interessa meno del 50% del territorio dell'arteria colpita;
    - 2b: se la riperfusione è pari o superiore al 50%.
- Grado 3: ricanalizzazione completa, con totale riempimento di tutti i rami distali dell'arteria. (Rosi et al., 2019)]

Nella pratica clinica e nei principali studi, i punteggi mTICI 2b e 3 sono generalmente considerati buoni risultati, in quanto associati a una prognosi più favorevole. Tuttavia, analisi recenti della letteratura e dei dati di trial più aggiornati suggeriscono che il grado 2b, includendo tutte le ricanalizzazioni ≥50%, racchiuda casi con esiti clinici molto variabili, rendendo difficile una valutazione uniforme. Per questo motivo è stata proposta una versione rivisitata della scala, la rTICI (revised TICI), che introduce il grado 2c, indicativo di una ricanalizzazione quasi completa, ad eccezione di un flusso rallentato o della presenza di piccoli emboli in rami corticali distali.

Studi recenti hanno mostrato che i pazienti con punteggio rTICI 2c hanno un outcome clinico paragonabile a quelli con ricanalizzazione completa (rTICI 3). Di conseguenza, i gradi 2c e 3 sono oggi considerati gli obiettivi ideali del trattamento endovascolare. (Rosi et al., 2019)

Sempre tra gli score post procedurali che vengono utilizzati per valutare l'esito della trombectomia figura la mRS; è stata in origine introdotta dal Dr. John Rankin nel 1957 dello Stobhill Hospital, Glasgow, in Scozia, come scala a 5 livelli, da 1 a 5 e successivamente modificata includendo il valore "0" per i pazienti che non avevano sintomi e il "6" per pazienti deceduti.

È una scala di valutazione utilizzata comunemente per misurare il grado di disabilità o dipendenza nelle attività quotidiane di persone che hanno subito un ictus o un altro evento con esito di disabilità neurologica. Fornisce informazioni sul livello di disabilità del paziente, ma può essere utile anche per il follow-up e per fare previsioni prognostiche. È diventata una delle più importanti scale utilizzate per misurare gli outcomes clinici nello stroke e viene considerata come buona per valori minori o uguali a 2. (Figura 5) (van Swieten et al., 1988)

Figura 18: modified Rankin Scale. (Saver et al., 2021)

Tra i fattori predittivi di un buon outcome figurano il Clot Burden Score e la presenza di circoli collaterali.

Il Clot Burden Score è un sistema di classificazione a 10 punti in cui un punteggio più basso indica una trombosi più estesa. Un punteggio di 10 indica assenza di trombo, al contrario, un punteggio di 0 corrisponde a un'occlusione completa e multisegmentaria

del vaso. I pazienti con un punteggio CBS più basso presentano minori probabilità di riperfusione, volumi finali di infarto maggiori al follow-up e un peggior outcome funzionale. Inoltre, trombi più lunghi possono risultare più difficili da rimuovere, richiedendo un maggior numero di tentativi e un tempo procedurale più lungo. (Derraz et al., 2021 - Rajan et al., 2022)

La presenza di circoli collaterali adeguati, valutabili mediante imaging prima della procedura, in particolare tramite Angio-TC, è stata dimostrata essere un fattore predittivo importante per l'esito della terapia; infatti, in pazienti con circoli collaterali validi pre-trattamento si ha un aumento significativo del tasso di ricanalizzazione dopo la terapia endovascolare, al contrario, nei pazienti con collaterali scarsi, una risposta favorevole potrebbe non verificarsi nemmeno in caso di ricanalizzazione ottimale. (Lajthia et al., 2023)

Un'ulteriore causa di fallimento della trombectomia meccanica è l'aterosclerosi intracranica, una delle cause più frequenti di insorgenza di ictus in particolare nella circolazione anteriore. Negli ultimi anni, l'aterosclerosi intracranica è sempre più riconosciuta come una delle principali sfide nel contesto della trombectomia meccanica, e la gestione ottimale di questi pazienti rimane ancora incerta. Il meccanismo alla base della mancata rivascolarizzazione in questi casi è attribuito, secondo l'ipotesi attuale, alla presenza di una stenosi residua severa fissa e/o a trombosi in situ con successiva riocclusione, condizioni che frequentemente richiedono trattamenti di salvataggio come antiaggreganti, angioplastica, posizionamento di stent, o una combinazione di queste modalità terapeutiche. (Lajthia et al., 2023)

Il numero ridotto di passaggi, inteso come numero di tentativi necessari alla rimozione dell'occlusione, è risultato significativamente associato a esiti clinici favorevoli, mentre un numero elevato di passaggi è stato correlato a un aumento del rischio di mortalità. Nonostante ciò, tale osservazione va interpretata con cautela: il numero di passaggi potrebbe in realtà riflettere fattori confondenti importanti, come la sede più prossimale dell'occlusione, l'eziologia complessa dell'occlusione, le decisioni dell'operatore o una maggiore severità della lesione, che rendono necessario un

maggior numero di tentativi. Resta quindi dibattuta la questione se interrompere la procedura dopo tre o più passaggi. Alcuni studi riportano che, indipendentemente dal numero di tentativi, il raggiungimento della ricanalizzazione è fondamentale per ottenere un outcome clinico migliore rispetto alla mancata ricanalizzazione. (Marnat et al., 2022)

Infine, un ulteriore fattore studiato sono i tempi che intercorrono durante le varie fasi, dalla comparsa dei sintomi alla ricanalizzazione. Fermo restando che, quando si parla di ictus, vale la regola "time is brain", cioè che la ricanalizzazione debba essere il più precoce possibile in quanto ogni minuto di ritardo può causare la morte di circa 1,9 milioni di neuroni, 14 miliardi di sinapsi e 12 km di fibre mieliniche, diversi studi hanno cercato di valutare come i diversi tempi nelle varie fasi possano incidere sull'esito della terapia. (Saver, 2006)

Tra i tempi valutati ci sono il "groin puncture to recanalization", il "stroke onset to recanalization", il "door to TC", il "door to needle", il "door to groin puncture", l'"imaging to recanalization".

Due tempi in particolare, se presi singolarmente, risultano significativi: il "groin puncture to recanalization" (GTR) quindi il tempo che intercorre tra l'inizio della procedura e l'avvenuta ricanalizzazione e, come detto prima, il "stroke onset to recanalization" quindi il tempo tra la comparsa dei sintomi alla ricanalizzazione. È stato dimostrato che GTR più brevi si associano ad un punteggio NIHSS alla dimissione minore, ad una minore mortalità a 90 giorni e maggiori probabilità di indipendenza funzionale a 3 mesi, definita come mRS $\leq$2. Sempre questo stesso studio ha messo anche in evidenza come, anche quando i tempi delle altre fasi sono bassi, un incremento del GTR peggiora l'esito per il paziente. Inoltre, il GTR è strettamente associato al numero di passaggi, poiché il fattore che nella maggior parte dei casi porta a procedure più lunghe è proprio questo, anch'esso fattore predittivo di fallimento nella ricanalizzazione. (de Mase et al., 2024)

5.2.4 Terapia di supporto

Secondo le attuali linee guida dell'AHA diverse terapie di supporto sono indicate in pazienti con ictus ischemico acuto:

- Ossigenoterapia: è raccomandata in quei pazienti che presentano una saturazione di O2 in aria ambiente <94% e nel caso in cui il paziente abbia uno stato di coscienza alterato oppure una disfunzione bulbare che possa compromettere la respirazione.
- Controllo della pressione arteriosa: è raccomandata la correzione di condizioni di ipovolemia ed ipotensione; nei pazienti con ipertensione che devono essere sottoposti a terapia fibrinolitica sono raccomandati valori pressori al di sotto dei 180/110 mmHg.
- Temperatura corporea: è raccomandato, nel caso di ipertermia, somministrare antipiretici per raggiungere una temperatura corporea <38° C. Rimangono ancora incerti eventuali benefici dell'ipotermia.
- Glicemia: è raccomandata la correzione di stati di ipoglicemia (<60 mg/dl); anche l'iperglicemia dovrebbe essere corretta fino a valori compresi tra i 140-180 mg/dl.
- Terapia antiaggregante: è raccomandata la somministrazione di aspirina tra le 24 e le 48 ore dopo terapia fibrinolitica; in pazienti con ictus di origine non cardioembolica, di gravità lieve con NHISS≤3, è indicata doppia terapia antiaggregante con aspirina e clopidogrel per 21 giorni dopo l'evento acuto, al fine di ridurre le recidive.
- Controllo dell'edema cerebrale: può essere ragionevole la somministrazione di terapia osmotica o l'iperventilazione per brevi periodi per ridurre l'edema cerebrale, mentre l'ipotermia, l'uso di barbiturici e la somministrazione di corticosteroidi non sono raccomandati. In casi selezionati può essere valutato l'approccio chirurgico con ventricolostomia o craniectomia.
- Controllo delle crisi epilettiche: l'uso di antiepilettici è raccomandato nel caso in cui si manifestino; la terapia profilattica però non mostra alcun beneficio. (Powers et al 2018 Guidelines for Management of Acute Ischemic Stroke e47. - https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000158)

6. Obiettivo dello studio

L'obiettivo dello studio è stato quello di valutare se, e in che modo, diversi parametri neuroradiologici e neurologici incidano sull'outcome clinico e il recupero funzionale dopo un evento ischemico acuto.

Il razionale alla base della valutazione risiede nell'osservazione che, come già riportato, alcuni pazienti possono presentare esiti neutri o addirittura peggiorativi in seguito al trattamento, rientrando nella categoria delle cosiddette ricanalizzazioni futili. Pertanto, l'obiettivo dello studio è stato indagare se sia possibile selezionare i pazienti in maniera più accurata, attraverso parametri radiologici e non radiologici, al fine di ridurre il ricorso a procedure inutili o potenzialmente dannose per la condizione clinica del paziente.

7. Metodologia dello studio

Lo studio si è basato su dati raccolti in collaborazione tra Neuroradiologia e Neurologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche e le medesime strutture del policlinico universitario di Tor Vergata.

I pazienti inclusi nello studio corrispondono a quelli che si sono presentati consecutivamente per effettuare un trattamento endovascolare di trombectomia meccanica presso i servizi di neuroradiologia interventistica dell'Azienda Ospedaliera – Universitaria delle Marche e Policlinico Universitario Tor Vergata, nell'arco degli anni 2022 e 2023.

Di ogni paziente, laddove disponibili, sono stati raccolti diversi parametri:

1. Età e sesso
2. Orario di svolgimento della TC basale
3. Presenza o assenza di RM pre-procedurale
4. Presenza o assenza di TC perfusionale
5. Mismatch volume e mismatch ratio (nel caso sia stata fatta la TC perfusionale)
6. Localizzazione dell'occlusione
7. Emisfero colpito
8. ASPECT pre-procedurale
9. Presenza o assenza del segno di iperdensità a livello dell'occlusione
10. Clot Burden Score
11. Stato dei collaterali mediante diverse metodologie
12. Fallimento della ricanalizzazione
13. Numero di passaggi
14. TICI
15. Presenza di complicanze in seguito alla procedura
16. Durata della procedura
17. ASPECT a 24h dalla trombectomia

Tutti questi dati raccolti su un totale di 328 pazienti sono poi stati integrati con dati clinici, dei medesimi pazienti, provenienti dalla UOC Clinica di Neurologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche ed infine uniti con quelli provenienti dal Policlinico di Tor Vergata, risultando in un campione di 844 pazienti.

Variabile	Tipo	Media (±DS)	Mediana [IQR]	Min-Max	N
Età	Numerica	73.3 ± 13.1	76.0 [66.0-83.0]	23 - 99	844
lato stroke dx=0 sn=1	Numerica	0.5 ± 0.5	1.0 [0.0-1.0]	0.0 - 2.0	839
glicemia in PS	Numerica	130.7 ± 48.2	119.0 [100.0-146.0	49.0 - 454.0	788
Neutrofili	Numerica	3157.3 ± 4579.9	9.1 [5.5-6540.0]	1.93 - 21970.0	844
Linfociti	Numerica	543.5 ± 1035.1	2.5 [1.3-920.5]	0.2 - 17140.0	844
NLR	Numerica	6.8 ± 6.4	5.0 [2.7-9.0]	0.35608856088560886 - 71.	844
Wake up/esordio non noto (0=no 1=si)	Numerica	0.2 ± 0.4	0.0 [0.0-0.0]	0.0 - 1.0	835
mismatch volume (ml)	Numerica	103.4 ± 67.8	90.0 [60.0-137.0]	0.0 - 440.0	149
mismatch ratio	Numerica	15.3 ± 27.4	5.1 [2.8-12.7]	0.0 - 169.0	110
ASPECT on CTA (ANGIO TC)_solo numero	Numerica	6.9 ± 2.6	7.0 [5.0-9.0]	0.0 - 10.0	437
ASPECT on NECT (TC Basale) solo numero	Numerica	8.4 ± 1.9	9.0 [7.0-10.0]	0.0 - 10.0	757
Clot Burden Score (0=completee occlusion; 10=patent vasculature)	Numerica	7.1 ± 1.5	8.0 [6.0-8.0]	1.0 - 10.0	786
Collateral flow Grading System(sec. Christoforidis)	Numerica	2.6 ± 1.1	2.0 [2.0-3.0]	1.0 - 6.0	572
Door to groin puncture time (min)	Numerica	148.5 ± 98.6	118.0 [76.0-220.0]	7.0 - 730.0	737
Procedural time (formula) Groin to recanalization	Numerica	45.2 ± 34.5	36.0 [22.0-59.0]	0.0 - 356.0	778
ICH a 24 h (0=no; 1=si) se si precoce anche qui si	Numerica	0.4 ± 0.5	0.0 [0.0-1.0]	0.0 - 1.0	837

Figura 19: Dati epidemiologici.

L'algoritmo è stato sviluppato per predire l'outcome clinico post-ictus ischemico utilizzando come target la variabile NIHSS stratificato, suddivisa in tre categorie:

- Classe 0 = esito neutro (nessuna variazione clinicamente significativa),
- Classe 1 = miglioramento,
- Classe 2 = peggioramento.

Le classi sono state ottenute tramite stratificazione di NIHSS a onset e a dimissione secondo la seguente scala:

- 1 - 4 lieve
- 5 – 15 moderato
- 16 – 20 da moderato a grave
- 21 – 42 grave

Se il paziente ha classe di NIHSS a onset = classe di NIHSS dimissione: NIHSS stratificato = 0 (esito neutro)

Se il paziente ha classe di NIHSS a onset > di classe NIHSS dimissione: NIHSS stratificato = 1 (miglioramento)

Se il paziente ha classe di NIHSS a onset < di classe NIHSS dimissione: NIHSS stratificato = 2 (peggioramento)

L'analisi statistica è stata condotta tramite un algoritmo di machine learning (XGBoost) addestrato sui dati clinici dei pazienti per prevedere l'andamento dell'ictus in termini di stratificazione del punteggio NIHSS.

È stato utilizzato XGBoost (Extreme Gradient Boosting), una tecnica di machine learning basata su ensemble di alberi decisionali, una tecnica che costruisce sequenzialmente alberi decisionali "deboli" e li combina in modo iterativo per ridurre gli errori.

Per rendere il modello clinicamente interpretabile sono stati utilizzati due strumenti:

1. Permutation Importance - misura il peso medio di ciascuna variabile nella predizione;
2. SHAP (SHapley Additive exPlanations): permette di valutare per ogni paziente e variabile la direzione dell'effetto (se aumenta o riduce la probabilità di appartenere a una classe).

8. Risultati

8.1 Analisi di permutation importance

Interpretazione delle principali variabili:

1. Farmaci in prevenzione primaria (eparina)
    - È nettamente la variabile più importante.
    - Interpretazione clinica: la terapia anticoagulante/antiaggregante assunta prima dell'ictus ha un peso determinante sull'evoluzione. Potrebbe riflettere sia un effetto protettivo sia una selezione di pazienti con comorbidità più severe.
2. Neutrofili
    - Seconda variabile in ordine di importanza.
    - Un marcatore ematologico-infiammatorio: livelli elevati al ricovero sono noti in letteratura come associati a prognosi peggiore, e il modello conferma questa rilevanza.
3. Altri farmaci in prevenzione primaria
    - La ripetuta comparsa di variabili legate alla prevenzione farmacologica indica che non è solo il singolo farmaco a contare, ma l'intero profilo terapeutico del paziente.
4. Glicemia in pronto soccorso (glicemia in PS)
    - Compare tra le prime cinque variabili.
    - È un fattore noto: l'iperglicemia in fase acuta è correlata a prognosi sfavorevole, probabilmente per danno neuronale aggiuntivo e peggiore risposta ai trattamenti.
5. Fattori clinici e anagrafici aggiuntivi

- Ipertensione arteriosa pre-ictus: segnala una fragilità vascolare preesistente, che abbassa la probabilità di outcome favorevole.
- Deterioramento cognitivo pre-stroke: i pazienti con deficit cognitivi pregressi hanno minore capacità di recupero funzionale.
- DBP in PS: la pressione arteriosa diastolica ha un ruolo moderato, ma influenza la perfusione cerebrale e quindi gli esiti.
- TOAST: l'eziologia dell'ictus (cardioembolico, aterotrombotico, lacunare, ecc.) è meno importante rispetto ai parametri acuti e ai farmaci, ma contribuisce comunque.



Figura 20: Analisi di permutation importance.

8.2 Analisi di SHAP del Gruppo 0

Fattori principali emersi:

1. mRS alla dimissione
    - Valori più alti → SHAP positivi → aumentano la probabilità di outcome neutro.
    - Valori più bassi → SHAP negativi → riducono la probabilità di neutralità, spingendo verso miglioramento.
2. Anamnesi di ischemia cerebrale (IA)

- Presenza di ischemia pregressa → SHAP positivi → maggiore probabilità di stabilità clinica.

3. Diabete mellito (DM)
    - Presenza di DM → SHAP positivi → outcome neutro più probabile.
    - Pazienti senza diabete → più variabilità clinica (miglioramento o peggioramento).
4. Farmaci in prevenzione primaria
    - Diverse combinazioni (ASA, Plavix, statine, NAO/TAO, enoxaparina) influenzano la probabilità di esito neutro.
    - Alcune configurazioni spingono verso neutralità, altre la riducono.
5. Stenosi carotidea lato non sintomatico
    - Assenza di stenosi → SHAP negativi (meno neutro, più variazione).
    - Presenza di stenosi → SHAP positivi (più neutro).
6. TICI (grado di ricanalizzazione)
    - Valori bassi o mancanti → SHAP positivi (più neutro).
    - Valori alti → SHAP negativi (meno neutro, più probabilità di miglioramento).
7. Abuso di alcolici
    - Presenza → SHAP positivi → outcome neutro più probabile.
8. Cardiopatia ischemica
    - Presenza → SHAP positivi → pazienti con cardiopatia hanno minore probabilità di variare l'outcome, rimanendo più stabili.
9. Pressione arteriosa diastolica (DBP in PS)
    - Valori alti → SHAP positivi (più neutro).
    - Valori bassi → SHAP negativi (meno neutro, più probabilità di cambiamento).
10. Lato dello stroke (dx=0, sn=1)
    - Stroke lato sinistro (sn=1) → SHAP positivi → maggiore probabilità di outcome neutro
    - Stroke lato destro (dx=0) → SHAP negativi → minore probabilità di outcome neutro, con più pazienti che vanno verso miglioramento o peggioramento.

Figura 21: Beeswarm classe 0

8.3 Analisi di SHAP del Gruppo 1

1. Classificazione TOAST (eziologia)
    - Alcuni sottotipi (es. cardioembolico o lacunare) tendono a spostare SHAP verso valori positivi → aumentano la probabilità di miglioramento.
    - Altri sottotipi (etiologia "other") sono meno favorevoli.
2. Farmaci in prevenzione primaria
    - Diverse combinazioni di ASA, Plavix, NAO/TAO e statina compaiono come driver.
    - In particolare, i pazienti già in prevenzione farmacologica mostrano SHAP positivi → maggiore probabilità di miglioramento.
    - L'assenza di terapia preventiva tende invece a ridurre le probabilità di recupero.
3. Ipercolesterolemia
    - La presenza di ipercolesterolemia (rosso) è associata a SHAP positivi → favorisce outcome di miglioramento.

- Possibile spiegazione: questi pazienti sono spesso già in prevenzione con statine, che possono avere un ruolo protettivo.

4. TICI (grado di ricanalizzazione)
    - Un TICI = 0 (assenza di ricanalizzazione) tende a ridurre la probabilità di miglioramento (SHAP negativi).
    - Valori più alti di TICI (non riportati qui ma emersi in altre analisi) spingono in direzione opposta → ricanalizzazione efficace è favorevole al recupero.
5. FA in anamnesi o durante ricovero
    - La presenza di fibrillazione atriale tende a ridurre le probabilità di miglioramento (SHAP negativi).
    - Questo riflette il noto impatto della FA come fattore prognostico negativo.
6. Diabete mellito (DM)
    - Presenza di DM → SHAP negativi → riduce la probabilità di miglioramento.
    - Conferma il ruolo del diabete come comorbidità sfavorevole.
7. Cardiopatia ischemica
    - La presenza tende anch'essa a spostare verso SHAP negativi → minore probabilità di recupero.
8. TC perfusione
    - L'esecuzione di una perfusione TC pre-procedura compare come fattore positivo, associato a SHAP > 0.
    - Probabile che rappresenti pazienti selezionati più accuratamente, quindi con maggior beneficio dalla ricanalizzazione.
9. Pressione arteriosa diastolica in pronto soccorso (DBP in PS)
    - Valori bassi → SHAP positivi → più probabilità di miglioramento
    - Valori alti → SHAP negativi → minore probabilità di miglioramento.



Figura 22: Beeswarm Gruppo 1

8.4 Analisi di SHAP del Gruppo 2

1. Farmaci in prevenzione primaria
    - Alcune categorie di prevenzione farmacologica (combinazioni di ASA, clopidogrel, NAO/TAO, statina) compaiono con SHAP > 0.
    - In particolare:
        - Assenza di statina prima dell'ictus → aumenta la probabilità di peggioramento.
        - Categorie "MISSING" o incomplete → anch'esse associate a outcome sfavorevole.
    - Questo suggerisce che l'assenza o la sospensione di prevenzione farmacologica sia un predittore negativo.
2. SBP (pressione arteriosa sistolica in PS)
    - Valori elevati tendono a spingere SHAP verso destra → peggioramento.
    - Pressioni più basse risultano meno sfavorevoli.
3. TICI
    - Valori bassi (es. TICI = 0, nessuna ricanalizzazione) sono associati a SHAP positivi → peggioramento clinico.

- Questo conferma l'importanza di una ricanalizzazione efficace.

4. Pregresso TIA/Ictus
    - Una storia di eventi cerebrovascolari precedenti tende ad aumentare la probabilità di peggioramento (SHAP > 0).
    - Probabilmente perché riflette un substrato vascolare già compromesso.
5. Cardiopatia ischemica
    - La sua presenza spinge il modello verso la classe 2, riducendo le chance di recupero.
6. Fumo
    - Presenza di fumo attivo o pregresso >10 anni → SHAP positivi → peggioramento.
    - Ulteriore conferma dell'impatto sfavorevole di fattori di rischio vascolari classici.
7. TC perfusion
    - La variabile compare, ma qui sembra associata più a SHAP positivi → peggioramento.
    - Interpretazione possibile: i pazienti sottoposti a perfusione sono quelli clinicamente più gravi/selezionati, quindi più a rischio di peggioramento.
8. Abuso di alcolici
    - La presenza è associata a SHAP positivi → peggioramento.
9. Lato stroke (dx=0, sn=1)
    - I casi con stroke a sinistra (sn=1) sembrano avere SHAP leggermente positivi → maggiore rischio di peggioramento.
    - Questo potrebbe riflettere la maggiore compromissione funzionale associata agli ictus dell'emisfero sinistro (linguaggio, funzioni cognitive).
10. DBP (pressione arteriosa diastolica in PS)
    - Valori alti tendono a essere associati a SHAP positivi, quindi peggioramento.



Figura 23: Beeswarm Gruppo 2

8.5 Mismatch ratio

- I punti del mismatch ratio sono concentrati intorno a SHAP = 0, segno che nella maggior parte dei pazienti questa variabile non sposta in modo sostanziale la probabilità predetta di outcome.
- Non si osserva un gradiente chiaro che indichi un effetto sistematico verso outcome favorevoli o sfavorevoli.

Nel dataset il mismatch ratio non ha avuto un impatto rilevante sulle predizioni rispetto ad altre variabili come i farmaci pre-ictus, i neutrofili, la glicemia o i fattori clinici.

- Questo può avere diverse spiegazioni:
    - Qualità o numerosità dei dati radiologici: se i dati sono incompleti o poco bilanciati, l'algoritmo tende a minimizzarne il peso.
    - Fattori clinici dominanti: nel campione, la prognosi potrebbe essere più legata a comorbidità e terapia pregressa che ai parametri radiologici.

Correlazione con altre variabili: è possibile che il mismatch ratio sia correlato con altre misure di imaging o cliniche già più predittive, e quindi non porti informazione aggiuntiva

9. Discussione

Per quanto riguarda i dati neuroradiologici, un ruolo di primaria importanza è rivestito dal punteggio TICI, comunemente utilizzato per valutare il grado di ricanalizzazione dopo procedure di rivascolarizzazione endovascolare. Nel nostro studio è emerso come valori di TICI ≥ 2b siano significativamente associati a un outcome clinico più favorevole, confermando quanto già ampiamente riportato in letteratura.

In particolare, studi come quelli di Kaesmacher et al.,2018, e Chamorro et al., 2017, hanno evidenziato che il raggiungimento di TICI 3, ossia una ricanalizzazione completa, è correlato a un esito migliore a 90 giorni rispetto a TICI 2b, che invece indica una ricanalizzazione subtotale ma comunque estesa ad almeno i due terzi del territorio coinvolto. Sebbene nel nostro lavoro non sia stata condotta una comparazione diretta tra queste due categorie, i dati raccolti confermano che l'ottenimento di una riperfusione totale o quantomeno estesa rappresenti un determinante cruciale della prognosi. Questo aspetto giustifica la continua ricerca di metodologie e tecniche endovascolari avanzate al fine di ottimizzare la qualità della ricanalizzazione e ad incrementare la probabilità di raggiungere TICI 3.

Al contrario, valori bassi di TICI (0–2a), corrispondenti a una ricanalizzazione assente o solo parziale, risultano associati a esiti clinici nettamente peggiori. In tali circostanze, la persistenza di una quota significativa di tessuto cerebrale ischemico non riperfuso può determinare un aumento dell'estensione finale dell'infarto. Numerosi studi hanno dimostrato che un'incompleta riperfusione non è sufficiente a garantire la sopravvivenza della penombra ischemica, riducendo in modo sostanziale le possibilità di recupero funzionale.

Nel complesso, i nostri dati rafforzano l'evidenza che la qualità della ricanalizzazione rappresenti uno degli indicatori più affidabili di outcome clinico favorevole dopo trattamento endovascolare. L'obiettivo terapeutico non deve quindi limitarsi al semplice ripristino di un flusso parziale, ma mirare a una ricanalizzazione quanto più completa possibile, anche attraverso l'adozione di dispositivi e procedure sempre più efficaci. Questo approccio consente di massimizzare le probabilità di recupero

funzionale e di migliorare la prognosi a lungo termine dei pazienti colpiti da ictus ischemico acuto.

Un importante fattore associato a una prognosi sfavorevole è la presenza in anamnesi di precedenti eventi ischemici cerebrali. In accordo con il nostro studio, anche altri come quello di Chen et al. (2020) hanno evidenziato che, dopo un primo ictus ischemico, il rischio di recidiva a 5 anni è elevato, pari al 41%, mentre la mortalità a lungo termine si attesta intorno al 17%. La letteratura dimostra inoltre che la recidiva degli eventi ischemici comporta un significativo aumento della mortalità e di eventi vascolari maggiori rispetto al primo ictus. In generale, gli ictus recidivi sono associati a esiti clinici peggiori, con un maggior grado di disabilità e un aumento del rischio di morte, poiché colpiscono un parenchima cerebrale e un sistema vascolare già compromessi dal precedente evento ischemico, che risultano quindi più vulnerabili e meno capaci di recupero.

Riguardo alla correlazione presente tra eziologia ed esito dell'ictus la letteratura non fornisce una risposta univoca. Dai nostri dati emerge che l'origine cardioembolica e lacunare si associano a prognosi più favorevoli in seguito a terapia.

Lo studio condotto da Matusevicius et al. (2021) ha correlato le due principali eziologie, cardioembolica e su base aterosclerotica, con la prognosi in seguito a terapia, dimostrando come, in accordo con il nostro studio, i primi abbiano tendenzialmente una prognosi migliore, nonostante il fatto che se, confrontati con i secondi, avessero età più avanzata, NHISS più alto all'ammissione e più frequentemente ipertensione arteriosa in anamnesi. La spiegazione di ciò sarebbe da ricercare nel fatto che i pazienti con ictus su base aterosclerotica richiedano tempi procedurali più lunghi per l'esecuzione della trombectomia che, inoltre, spesso risulta non ottimale con ricanalizzazioni solo parziali e che siano soggetti più frequente a re-occlusione dovuta all'instabilità della placca. Inoltre, lo studio di Yin et al., 2025, ha sottolineato come un fattore fondamentale sia il tempo dall'onset alla ricanalizzazione nelle due tipologie: fino ad un massimo di 240 minuti, la prognosi risulta simile nei due gruppi, mentre superato questo limite quelli ad eziologia cardioembolica tendono ad avere esiti peggiori, probabilmente dovuto alla minor quantità di collaterali e ad un

mancato “precondizionamento” all’ischemia, entrambe prerogative dell’eziologia aterosclerotica.

Al contrario i risultati dello studio di Sun et al., 2019, affermano che l’eziologia aterosclerotica si associa ad una prognosi migliore grazie al minore NHISS all’ammissione, alla migliore qualità dei circoli collaterali e alla minore incidenza di emorragia intracerebrale post-trombectomia.

Riassumendo, la prognosi dell’ictus cardioembolico e di quello a base aterosclerotica risulta oggetto di risultati contrastanti in letteratura. L’ictus cardioembolico tende a presentarsi con quadri clinici più gravi ma beneficia spesso di una migliore risposta a trombectomia, mentre quello aterosclerotico può avere un esordio meno severo e una migliore tolleranza ai ritardi terapeutici grazie ai collaterali, ma è associato a maggior rischio di re-occlusione e recidiva. Entrambe le eziologie presentano dunque punti di forza e criticità, rendendo l’interpretazione dei dati prognostici eterogenea e dipendente da popolazione, tempo di trattamento e contesto clinico.

Lo studio ha inoltre evidenziato come la lateralità dell’ictus, ovvero l’emisfero cerebrale colpito dall’evento ischemico, rappresenti un fattore rilevante nel determinare le possibilità di recupero funzionale e sia tra le variabili più strettamente associate a un cambiamento della classe di gravità clinica. Questo dato suggerisce che il lato della lesione, oltre alla sua estensione e localizzazione specifica, possa influenzare in maniera significativa il decorso clinico e le prospettive riabilitative dei pazienti.

Sebbene la causa sottostante a tale associazione non sia del tutto chiara né completamente desumibile dai nostri dati, è plausibile ipotizzare che un danno localizzato nell’emisfero sinistro, frequentemente associato a compromissioni delle funzioni linguistiche, possa influire negativamente sul processo di recupero. Alterazioni del linguaggio, sia a livello della produzione che della comprensione, possono infatti incidere non solo sulla capacità di comunicare i propri bisogni e di partecipare attivamente al percorso riabilitativo, ma anche sull’autonomia funzionale globale. Queste limitazioni possono riflettersi in punteggi più elevati nelle scale di gravità neurologica, come la NIHSS, e tradursi in un decorso clinico più complesso.

In linea con queste osservazioni, diversi studi hanno già sottolineato il ruolo della compromissione del linguaggio come fattore prognostico indipendente. Ad esempio, Kongsawasdi et al., 2018, hanno dimostrato come la presenza di afasia e disartria sia significativamente associata a esiti funzionali peggiori, a un prolungamento della durata della degenza ospedaliera e a una maggiore incidenza di complicanze durante la fase acuta del ricovero. Inoltre, i sopravvissuti all'ictus con afasia mostrano un impatto negativo marcato sulla qualità della vita: il deficit linguistico non solo condiziona la partecipazione sociale e le relazioni interpersonali, ma è anche correlato a un aumento del disagio emotivo, a una più elevata incidenza di depressione post-ictus, a un peggioramento della qualità dell'andatura e, in alcuni studi, a un incremento della mortalità.

Nel complesso, i dati del nostro studio confermano l'importanza di considerare la lateralità dell'ictus come variabile prognostica di rilievo e sottolineano la necessità di approcci diagnostico-terapeutici personalizzati. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata ai pazienti con lesioni emisferiche sinistre e con disturbi del linguaggio, attraverso un supporto riabilitativo precoce, multidisciplinare e mirato non solo al recupero motorio, ma anche alle funzioni cognitive e comunicative, al fine di ottimizzare il recupero funzionale globale e migliorare la qualità della vita a lungo termine.

Per quanto riguarda la TC Perfusionale, nel nostro studio compare sia come fattore favorente che ostacolante un outcome migliore in seguito a trombectomia. Questo dato contraddittorio è verosimilmente dovuto al fatto che:

- All'interno del nostro campione, il numero di pazienti su cui era stata effettuata la metodica era estremamente ridotto e i pazienti ad essa sottoposti molto eterogenei per caratteristiche radiologiche e cliniche.
- I pazienti sottoposti a TC Perfusionale sono generalmente pazienti che hanno un esordio della sintomatologia più tardivo (> 6 ore) e di conseguenza beneficiano meno della terapia in alcuni casi.

Allo stesso modo anche per il mismatch ratio, dato ricavato dalla stessa TC Perfusionale, non è possibile affermare una correlazione con l'outcome, risultando quindi non significativo.

10. Conclusioni

Il nostro studio ha evidenziato come l'esito della terapia per l'ictus ischemico acuto dipenda da una molteplicità di fattori, sia clinici che radiologici, e come pazienti con caratteristiche apparentemente simili possano presentare outcome differenti nonostante l'impiego delle stesse strategie diagnostico-terapeutiche.

In linea con quanto già riportato in letteratura, è stato confermato che, dal punto di vista radiologico, uno dei determinanti principali dell'esito è il raggiungimento di una ricanalizzazione completa e rapida, a testimonianza dell'importanza di continuare a investire nell'ottimizzazione delle procedure di trombectomia meccanica.

Al contrario, i dati relativi alla TC perfusionale e al mismatch ratio non hanno mostrato significatività statistica, discostandosi da quanto descritto in studi precedenti, nei quali la selezione di pazienti con un volume maggiore di penombra ischemica risulta invece associata a migliori outcome dopo trombectomia; molto probabilmente ciò è dovuto ad una scarsità numerica del campione in esame in quanto questa metodica è riservata solamente a quei pazienti con un onset della sintomatologia maggiore di 6 ore.

Alla luce dei risultati ottenuti, emerge con chiarezza la necessità di ulteriori ricerche in questo ambito, al fine di perfezionare i criteri di selezione dei pazienti candidati alla terapia di rivascolarizzazione. Un'accurata stratificazione dei pazienti consentirebbe infatti di identificare con maggiore precisione coloro che possono realmente beneficiare del trattamento, riducendo il rischio di incorrere in ricanalizzazioni futili, le quali non solo non apportano vantaggi clinici, ma possono addirittura determinare un peggioramento del quadro neurologico e funzionale. Un approccio più mirato potrebbe quindi tradursi in un uso più appropriato delle risorse, in una riduzione delle complicanze e, soprattutto, in un miglioramento degli outcome funzionali a lungo termine.

11.Bibliografia

1. Bamford, J., Sandercock, P., Dennis, M., Warlow, C., & Burn, J. (1991). Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction. *The Lancet, 337*(8756), 1521–1526. https://doi.org/10.1016/0140-6736(91)93206-O

2. Bang, O. Y., Saver, J. L., Kim, S. J., Kim, G. M., Chung, C. S., Ovbiagele, B., Lee, K. H., & Liebeskind, D. S. (2011). Collateral flow predicts response to endovascular therapy for acute ischemic stroke. *Stroke, 42*(3), 693–699. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.110.595256/SUPPL_FILE/SUPPLEMENTARY_MATERIAL_595256.PDF

3. Becker, H., Desch, H., Hacker, H., & Pencz, A. (1979). CT fogging effect with ischemic cerebral infarcts. *Neuroradiology, 18*(4), 185–192. https://doi.org/10.1007/BF00345723

4. Bhatia, R., Bal, S. S., Shobha, N., Menon, B. K., Tymchuk, S., Puetz, V., Dzialowski, I., Coutts, S. B., Goyal, M., Barber, P. A., Watson, T., Smith, E. E., & Demchuk, A. M. (2011). CT angiographic source images predict outcome and final infarct volume better than noncontrast CT in proximal vascular occlusions. *Stroke, 42*(6), 1575–1580. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.110.603936/SUPPL_FILE/BHATIA_2254.PDF

5. Brott, T., Adams, H. P., Olinger, C. P., Marle, J. R., Barsan, W. G., Biller, J., Spilker, J., Holleran, R., Eberle, R., Hertzberg, V., Rorick, M., Moomaw, C. J., & Walker, M. (1989). Measurements of acute cerebral infarction: A clinical examination scale. *Stroke, 20*(7), 864–870. https://doi.org/10.1161/01.STR.20.7.864

6. Chamorro, Á., Blasco, J., López, A., Amaro, S., Román, L. S., Llull, L., Renú, A., Rudilosso, S., Laredo, C., Obach, V., Urra, X., Planas, A. M., Leira, E. C., &

MacHo, J. (2017). Complete reperfusion is required for maximal benefits of mechanical thrombectomy in stroke patients. Scientific Reports, 7(1), 1–7. https://doi.org/10.1038/S41598-017-11946-Y;SUBJMETA

7. Chaturvedi, S., Cole, J. W., Cornwell III, W. K., Cosby-Gaither, C., Doyle, S., Goldstein, L. B., Lennon, O., Levine, D. A., Love, M., Miller, E., Nguyen-Huynh, M., Rasmussen-Winkler, J., Rexrode, K. M., Rosendale, N., Sarma, S., Shimbo, D., Simpkins, A. N., Spatz, E. S., Sun, L. R., … Whelton, P. K. (2024). 2024 Guideline for the Primary Prevention of Stroke: A Guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke, 55*(12), e344–e424. https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000475/FORMAT/EPUB

8. Chen, P. H., Gao, S., Wang, Y. J., Xu, A. D., Li, Y. S., & Wang, D. (2012). Classifying Ischemic Stroke, from TOAST to CISS. *CNS Neuroscience & Therapeutics, 18*(6), 452–456. https://doi.org/10.1111/J.1755-5949.2011.00292.X

9. Chen, Y., Wright, N., Guo, Y., Turnbull, I., Kartsonaki, C., Yang, L., Bian, Z., Pei, P., Pan, D., Zhang, Y., Qin, H., Wang, Y., Lv, J., Liu, M., Hao, Z., Wang, Y., Yu, C., Peto, R., Collins, R., … Qiu, Z. (2020). Mortality and recurrent vascular events after first incident stroke: a 9-year community-based study of 0·5 million Chinese adults. *The Lancet. Global Health*, *8*(4), e580. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30069-3

10. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. (n.d.). Retrieved July 22, 2025, from https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/01.STR.24.1.35

11. de Mase, A., Spina, E., Servillo, G., Barbato, S., Leone, G., Giordano, F., Renna, R., Ranieri, A., Iorio, W. di, Muto, M., Guarnieri, G., Muto, M., Candelaresi, P., & Andreone, V. (2024). Some minutes matter more: Groin-to-recanalization is the main time-related predictor of outcome in acute ischemic stroke. *Interventional Neuroradiology*. https://doi.org/10.1177/15910199241282714

12. Derraz, I., Pou, M., Labreuche, J., Legrand, L., Soize, S., Tisserand, M., Rosso, C., Piotin, M., Boulouis, G., Oppenheim, C., Naggara, O., Bracard, S., Clarençon, F., Lapergue, B., & Bourcier, R. (2021). Clot Burden Score and Collateral Status and Their Impact on Functional Outcome in Acute Ischemic Stroke. *AJNR: American Journal of Neuroradiology, 42*(1), 42. https://doi.org/10.3174/AJNR.A6865

13. García-Tornel, A., Carvalho, V., Boned, S., Flores, A., Rodríguez-Luna, D., Pagola, J., Muchada, M., Sanjuan, E., Coscojuela, P., Juega, J., Rodriguez-Villatoro, N., Menon, B., Goyal, M., Ribó, M., Tomasello, A., Molina, C. A., & Rubiera, M. (2016). Improving the Evaluation of Collateral Circulation by Multiphase Computed Tomography Angiography in Acute Stroke Patients Treated with Endovascular Reperfusion Therapies. *Interventional Neurology, 5*(3–4), 209–217. https://doi.org/10.1159/000448525

14. Hao, Y., Yang, D., Wang, H., Zi, W., Zhang, M., Geng, Y., Zhou, Z., Wang, W., Xu, H., Tian, X., Lv, P., Liu, Y., Xiong, Y., Liu, X., Xu, G., Liu, C., Shi, Z., Zhang, J., Lin, H., … Xiao, G. (2017). Predictors for Symptomatic Intracranial Hemorrhage after Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. *Stroke, 48*(5), 1203–1209. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.016368/SUPPL_FILE/STR_STROKE-2016-016368_SUPP1.PDF

15. Hedna, V. S., Bodhit, A. N., Ansari, S., Falchook, A. D., Stead, L., Heilman, K. M., & Waters, M. F. (2013). Hemispheric Differences in Ischemic Stroke: Is Left-Hemisphere Stroke More Common? *Journal of Clinical Neurology (Seoul, Korea)*, *9*(2), 97. https://doi.org/10.3988/JCN.2013.9.2.97

16. I fattori di rischio dell'Ictus - SIIA. (n.d.). Retrieved July 22, 2025, from https://siia.it/per-il-pubblico/lictus/i-fattori-di-rischio-dellictus/?doing_wp_cron=1753114423.1546161174774169921875

17. Ictus: i numeri in Italia - SIIA. (n.d.). Retrieved July 21, 2025, from https://siia.it/per-il-pubblico/lictus/ictus-i-numeri-in-italia/

18. Ischemic stroke | Radiology Case | Radiopaedia.org. (n.d.). Retrieved August 5, 2025, from https://radiopaedia.org/cases/ischemic-stroke-2

19. Ischemic stroke - chronic | Radiology Case | Radiopaedia.org. (n.d.). Retrieved August 5, 2025, from https://radiopaedia.org/cases/ischaemic-stroke-chronic-2?lang=us

20. Ischemic Stroke Clinical Presentation: History, Physical Examination. (n.d.). Retrieved August 9, 2025, from https://emedicine.medscape.com/article/1916852-clinical?form=fpf

21. Ischemic Stroke Treatment & Management: Approach Considerations, Emergency Response and Transport, Acute Management of Stroke. (n.d.). Retrieved July 30, 2025, from https://emedicine.medscape.com/article/1916852-treatment

22. Kaesmacher, J., Dobrocky, T., Heldner, M. R., Bellwald, S., Mosimann, P. J., Mordasini, P., Bigi, S., Arnold, M., Gralla, J., & Fischer, U. (2018). Systematic review and meta-analysis on outcome differences among patients with TICI2b versus TICI3 reperfusions: success revisited. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, *89*(9), 910. https://doi.org/10.1136/JNNP-2017-317602

23. Kakkar, P., Kakkar, T., Patankar, T., & Saha, S. (2021). Current approaches and advances in the imaging of stroke. *Disease Models & Mechanisms, 14*(12), dmm048785. https://doi.org/10.1242/DMM.048785

24. Kongsawasdi, S., Klaphajone, J., Watcharasaksilp, K., & Wivatvongvana, P. (2018). Prognostic Factors of Functional Recovery from Left Hemispheric Stroke. *The Scientific World Journal*, *2018*, 4708230. https://doi.org/10.1155/2018/4708230

25. Krishnan, R., Mays, W., & Elijovich, L. (2021). Complications of Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke. *Neurology, 97*(20), S115–S125. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012803/ASSET/93AB02EC-BD48-4A31-B763-79A7B865DF65/ASSETS/GRAPHIC/13TTU1.JPEG

26. Lajthia, O., Almallouhi, E., Ali, H., Essibayi, M. A., Bass, E., Neyens, R., Anadani, M., Chalhoub, R., Kicielinski, K., Lena, J., Porto, G., Sattur, M., Spiotta, A. M., & al Kasab, S. (2023). Failed mechanical thrombectomy: prevalence, etiology, and predictors. *Journal of Neurosurgery, 139*(3), 714–720. https://doi.org/10.3171/2022.12.JNS222152

27. Laurent, D., Small, C. N., Goutnik, M., & Hoh, B. (2025). Ischemic Stroke. *Acute Care Neurosurgery by Case Management: Pearls and Pitfalls*, 159–172. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99512-6_13

28. Lee, E. J., Kim, S. J., Bae, J., Lee, E. J., Kwon, O. D., Jeong, H. Y., Kim, Y., & Jeong, H. B. (2021). Impact of onset-to-door time on outcomes and factors associated with late hospital arrival in patients with acute ischemic stroke. *PLoS ONE*, *16*(3), e0247829. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0247829

29. Lobar hemorrhage | Radiology Case | Radiopaedia.org. (n.d.). Retrieved August 5, 2025, from https://radiopaedia.org/cases/lobar-haemorrhage

30. Mandalaneni, K., Rayi, A., & Jillella, D. v. (2024). Stroke Reperfusion Injury. *StatPearls*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564350/

31. Marnat, G., Gory, B., Sibon, I., Kyheng, M., Labreuche, J., Boulouis, G., Liegey, J. S., Caroff, J., Eugène, F., Naggara, O., Consoli, A., Mazighi, M., Maier, B., Richard, S., Denier, C., Turc, G., Lapergue, B., Bourcier, R., Tabarna, A., … Léger, Y. S. A. (2022). Mechanical thrombectomy failure in anterior circulation strokes: Outcomes and predictors of favorable outcome. *European Journal of Neurology, 29*(9), 2701. https://doi.org/10.1111/ENE.15429

32. Massari, F., Henninger, N., Lozupone, E., Malferrari, G., Pugliese, F., Mecarelli, O., Carletti, M., & Zedde, M. (2022). Time from Stroke Onset to Groin Puncture Predicts Successful Recanalization in Endovascular Treatment for Large Vessel Occlusion Stroke. *Frontiers in Neurology, 13*, 868127. https://doi.org/10.3389/FNEUR.2022.868127

33. Matsuo, R., Yamaguchi, Y., Matsushita, T., Hata, J., Kiyuna, F., Fukuda, K., Wakisaka, Y., Kuroda, J., Ago, T., Kitazono, T., Kamouchi, M., Ishitsuka, T., Ibayashi, S., Kusuda, K., Fujii, K., Nagao, T., Okada, Y., Yasaka, M., Ooboshi, H., … Fukushima, Y. (2017). Association between onset-to-door time and clinical outcomes after ischemic stroke. *Stroke*, *48*(11), 3049–3056. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.117.018132/-/DC1

34. Matusevicius, M., Cooray, C., Rand, V. M., Nunes, A. P., Moreira, T., Tassi, R., Egido, J. A., Ollikainen, J., Bigliardi, G., Holmin, S., & Ahmed, N. (2021). Stroke Etiology and Outcomes after Endovascular Thrombectomy: Results from the SITS Registry and a Meta-Analysis. *Journal of Stroke*, *23*(3), 388–400. https://doi.org/10.5853/JOS.2021.00850

35. Menon, B. K., d'Esterre, C. D., Qazi, E. M., Almekhlafi, M., Hahn, L., Demchuk, A. M., & Goyal, M. (2015). Multiphase CT Angiography: A New Tool for the Imaging Triage of Patients with Acute Ischemic Stroke. *Radiology, 275*(2), 510–520. https://doi.org/10.1148/RADIOL.15142256

36. Merwick, Á., & Werring, D. (2014). Posterior circulation ischaemic stroke. *BMJ, 348*, g3175. https://doi.org/10.1136/BMJ.G3175

37. Mokin, M., Primiani, C. T., Castonguay, A. C., Nogueira, R. G., Haussen, D. C., English, J. D., Farid, H., Gupta, R., Froehler, M. T., Rymer, M. M., Yoo, A. J., Kan, P., Zaidat, O. O., & Turk, A. S. (2016). Vessel perforation during stent retriever thrombectomy for acute ischemic stroke: technical details and clinical outcomes. *Journal of NeuroInterventional Surgery, 9*(10), 922–928. https://doi.org/10.1136/NEURINTSURG-2016-012633

38. Mokin, M., Sonig, A., Sivakanthan, S., Ren, Z., Elijovich, L., Arthur, A., Goyal, N., Kan, P., Duckworth, E., Veznedaroglu, E., Binning, M., Liebeskind, D., Rao, V. L., Hanel, R. A., Nogueira, R., Kirmani, J., Chen, M., & Siddiqui, A. H. (2016). Clinical and procedural predictors of outcomes from the endovascular treatment of posterior circulation strokes. *Stroke, 47*(3), 782–788. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.011598

39. Muir, K. W., & Buchan, A. (2004). Von Kummer R, Rother J, Baron J-C, et al. Imaging of acute stroke. Lancet Neurol 2000;9:29–38. *Lancet Neurology, 3*(6), 345–355. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00703-2

40. Non-contrast CT in acute stroke | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org. (n.d.). Retrieved August 5, 2025, from https://radiopaedia.org/articles/non-contrast-ct-in-acute-stroke

41. Puig, J., Blasco, G., Daunis-i-Estadella, J., Prats-Galino, A., Shuaib, A., Remollo, S., Laguillo, G., Boada, I., Pedraza, S., & Castellanos, M. (2012). High-Perfusion Lesion Volumes Better Predict Final Infarct Volume in Acute Ischemic Stroke. *Stroke, 43*(7), 1695–1701. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.111.639732

42. Purushotham, A., Campbell, B. C. V., Straka, M., Mlynash, M., Olivot, J. M., Bammer, R., & Albers, G. W. (2015). Apparent Diffusion Coefficient Threshold for Delineation of Ischemic Core. *International Journal of Stroke, 10*(6), 814–818. https://doi.org/10.1111/IJS.12177

43. Qin, C., Yang, S., Chu, Y. H., Zhang, H., Pang, X. W., Chen, L., Zhou, L. Q., Chen, M., Tian, D. S., & Wang, W. (2022). Signaling pathways involved in ischemic stroke: molecular mechanisms and therapeutic interventions. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, *7*(1), 215. https://doi.org/10.1038/S41392-022-01064-1

44. Ringleb, P. A., Bousser, M.-G., Ford, G., Bath, P., Brainin, M., Caso, V., Cervera, A., Chamorro, Á., Cordonnier, C., Csiba, L., Davalos, A., Diener, H.-C., Ferro, J.

M., Hacke, W., Hennerici, M. G., Kaste, M., Langhorne, P., Lees, K. R., Leys, D., … Wong, L. K. S. (2008). Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. *Cerebrovascular Diseases, 25*(5), 457–507. https://doi.org/10.1159/000131083

45. Sagnier, S., Galli, F., Poli, M., Debruxelles, S., Renou, P., Rouanet, F., & Sibon, I. (2019). Mechanical Thrombectomy in Patients with Acute Ischemic Stroke and ASPECTS ≤ 5 on Pretreatment CT: A Meta-Analysis. *AJNR: American Journal of Neuroradiology, 40*(3), 453–458. https://doi.org/10.3174/AJNR.A5972

46. Saver, J. L., Goyal, M., Bonafe, A., Diener, H. C., Levy, E. I., Pereira, V. M., Albers, G. W., Cognard, C., Cohen, D. J., Hacke, W., Jansen, O., Jovin, T. G., Mattle, H. P., Nogueira, R. G., Siddiqui, A. H., Yavagal, D. R., Baxter, B. W., Devlin, T. G., Lopes, D. K., … Bracard, S. (2015). Stent-Retriever Thrombectomy after Intravenous t-PA vs. t-PA Alone in Stroke. *The New England Journal of Medicine, 372*(24), 2285–2295. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1415061

47. Seners, P., Turc, G., Maïer, B., Mas, J. L., & Oppenheim, C. (2015). Incidence and Predictors of Early Reperfusion after Intravenous Thrombolysis. *Stroke, 46*(2), 418–423. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.114.006304

48. Simonsen, C. Z., Yoo, A. J., Sørensen, L. H., Juul, N., Johnsen, S. P., Andersen, G., & Schönenberger, S. (2018). Effect of General Anesthesia and Conscious Sedation During Endovascular Therapy on Infarct Growth and Clinical Outcomes in Acute Ischemic Stroke. *JAMA Neurology, 75*(4), 470–477. https://doi.org/10.1001/JAMANEUROL.2017.4474

49. Singer, O. C., Berkefeld, J., Nolte, C. H., Bohner, G., Haring, H. P., Trenkler, J., Gröschel, K., Müller-Forell, W., Niederkorn, K., Deutschmann, H., Neumann-Haefelin, T., du Mesnil de Rochemont, R., Bussmeyer, M., Mpotsaris, A., Eckert, B., Kastrup, A., Thomalla, G., Dichgans, M., & Fiehler, J. (2013). Mechanical

recanalization in basilar artery occlusion: The ENDOSTROKE study. *Annals of Neurology, 74*(3), 417–426. https://doi.org/10.1002/ANA.23906

50. Stroke Statistics - SIIA. (n.d.). Retrieved July 21, 2025, from https://siia.it/per-il-pubblico/lictus/ictus-i-numeri-in-italia/

51. Stroke syndromes | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org. (n.d.). Retrieved August 5, 2025, from https://radiopaedia.org/articles/stroke-syndromes

52. Su, D., Tsivgoulis, G., Hao, Q., Wang, Y., Li, Q., Yan, S., Parsons, M., Davis, S., Hacke, W., Zhao, X., Liu, L., & Wang, Y. (2016). Remote Ischemic Conditioning in the Treatment of Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ageing Research Reviews, 28*, 31–39. https://doi.org/10.1016/J.ARR.2016.04.004

53. Sun, B., Shi, Z., Pu, J., Yang, S., Wang, H., Yang, D., Hao, Y., Lin, M., Ke, W., Liu, W., Guo, F., Bai, Y., Zhang, S., Li, Z., Li, S., Zuo, M., Xu, G., Zi, W., & Liu, X. (2019). Effects of mechanical thrombectomy for acute stroke patients with etiology of large artery atherosclerosis. *Journal of the Neurological Sciences*, *396*, 178–183. https://doi.org/10.1016/J.JNS.2018.10.017

54. Tan, I. Y. L., Demchuk, A. M., Hopyan, J., Zhang, L., Gladstone, D., Wong, K., Martin, M., Symons, S. P., & Aviv, R. I. (2009). CT angiography clot burden score and collateral score: Correlation with clinical and radiologic outcomes in acute middle cerebral artery infarct. *AJNR: American Journal of Neuroradiology, 30*(3), 525–531. https://doi.org/10.3174/AJNR.A1408

55. Tong, E., Hou, Q., Fiebach, J. B., Wintermark, M., & González, R. G. (2014). Radiological history of brain hemorrhage and clinical relevance. *Frontiers of Neurology and Neuroscience, 36*, 87–93. https://doi.org/10.1159/000360057

56. Turk, A. S., Spiotta, A., Frei, D., Mocco, J., Baxter, B., Fiorella, D., Siddiqui, A., Mokin, M., Dewan, M., Woo, H., Arthur, A., English, J., Turner, R., Maughan, P., Mahan, M., & Chaudry, I. (2014). Initial clinical experience with the ADAPT

technique: A direct aspiration first pass technique for stroke thrombectomy. *Journal of NeuroInterventional Surgery, 6*(3), 231–237. https://doi.org/10.1136/NEURINTSURG-2013-010713

57. Turk, A. S., Turner, R., Spiotta, A., Vargas, J., Holmstedt, C., Ozark, S., Chaudry, I., & Mocco, J. (2015). Comparison of endovascular treatment approaches for acute ischemic stroke: Aspiration versus stent retriever techniques. *Journal of NeuroInterventional Surgery, 7*(9), 666–670. https://doi.org/10.1136/NEURINTSURG-2014-011355

58. Vagal, A., Aviv, R., Sucharew, H., Reddy, M., Hou, Q., Michel, P., Jovin, T., Wintermark, M., Fiehler, J., Liebeskind, D., Baird, G., Bivard, A., Linfante, I., Hacke, W., Warach, S., Hill, M., Mocco, J., Davis, S., Parsons, M., … Broderick, J. (2018). Collateral clock is more important than time clock for tissue fate: A natural history study of collateral delay and infarct growth. *Stroke, 49*(9), 2102–2107. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021234

59. von Kummer, R., & Hacke, W. (1992). Safety and efficacy of intravenous tissue plasminogen activator and heparin in acute middle cerebral artery stroke. *Stroke, 23*(5), 646–652. https://doi.org/10.1161/01.STR.23.5.646

60. Wang, H., & Liebeskind, D. S. (2016). Collateral circulation in ischemic stroke. *Stroke, 47*(2), 570–577. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.011757

61. Willard, S. S., & Koochekpour, S. (2013). Glutamate, Glutamate Receptors, and Downstream Signaling Pathways. *International Journal of Biological Sciences*, *9*(9), 948. https://doi.org/10.7150/IJBS.6426

62. Wintermark, M., Albers, G. W., Broderick, J. P., Demchuk, A. M., Fiebach, J. B., Fiehler, J., Grotta, J. C., Hacke, W., Kidwell, C. S., Lansberg, M. G., Lee, T. Y., Lees, K. R., Lev, M. H., Liebeskind, D. S., Ostergaard, L., Powers, W. J., Provenzale, J. M., Schellinger, P. D., Sorensen, A. G., … Warach, S. (2013).

Acute Stroke Imaging Research Roadmap II. *Stroke, 44*(9), 2628–2639. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.113.002015

63. Yin, Y., Chen, H., Wang, A., Zhang, X., Li, M., Song, L., Jia, B., Ma, N., Mo, D., Sun, X., Gao, F., Deng, Y., & Miao, Z. (2025). Time dependency of thrombectomy for large artery atherosclerosis versus cardioembolic stroke subtypes: evidence from the ANGEL-ACT registry. *Frontiers in Neurology*, *16*, 1574948. https://doi.org/10.3389/FNEUR.2025.1574948/FULL